

Lung Paclitaxel- Gemcitabin

Cykellängd 21 dagar

Indikation

Småcellig lungcancer samt ickesmåcellig lungcancer. Kan vara ett alternativ vid tredje linjens behandling.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Paclitaxel (Taxol)	100	1	2	i.v.	1,8
B	Gemcitabin (Gemzar)	1000	1	2	i.v.	1,8

	Substans/dag	1	8	Dag 9-21 paus	Dag 22 ny cykel
A	Paclitaxel	A	A	-	
B	Gemcitabin	B	B	-	

Övrigt

- Allergiprofylax – se bröstregimerna.
- Antiemetika (4 mg Ondansetron i.v. första gången, därefter efter behov).
- Betametason 8 mg. po inför samtliga behandlingar.
- Antal cykler: 4 st (småcellig lungcancer)
- Ge EJ strålbehandling vid behandling med gemcitabin. För detaljer - se regionalt vårdprogram sydöstra sjukvårdsregionen

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	TPK
	<1,5	< 100
Paclitaxel	Behandlingen uppskjutes 1 vecka	Behandlingen uppskjutes 1 vecka

[Patientinformation](#) (ändra diagnos)

Körschema Gemcitabin - Paclitaxel, lungcancer, dag 1 och dag 8

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Ha adrenalin, ringer-acetat, betametason, klemastin tillgängligt		
2	Sätt spoldropp. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		
3	Ge premedicinering mot allergisk reaktion - ges ca 30-60 minuter före Paclitaxel		Cytodose
6	Ge antiemetika- Ondansetron (oftast enbart första gången)		Cytodose
7	Ge Paclitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst	120 minuter (kan minskas till 60-90 minuter om det gick bra förra gången)	Cytodose
8	Ge Gemcitabin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose

Anmärkningar

- Vikt behandlingsdagen.
- Specialfilter, samt pvc-fritt aggregat krävs för paclitaxel, skickas med från apoteket
- Provtagning - **Nadir vid kur 1**
Dag -1, dag 7 samt dag 21: Blodstatus med neutrofila, kreatinin, kalium, natrium, albumin, korr-Ca, ALP, ALAT, LD, CRP.
Dag 15 Blodstatus med neutrofila + kreatinin
- Blodtryckskontroll -innan behandlingsstart (samt 5, 10, 15 minuter efter start de första 2 behandlingarna)