

## Lung Pralsetinib (Garveto)

Kontinuerlig behandling. Tyrosinkinashämmare.

### Indikation

Icke småcellig lungcancer. RET-fusionspositiv (rearrangerad under transfektion) status ska fastställas.

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm
A	Pralsetinib (Garveto)	400 mg	1	Kontinuerlig behandling	p.o.

Kapselstyrka: 100 mg

### Övrigt

#### • Prover och kontroller:

Inför behandlingstart

Blodstatus + neutrofila, njurstatus, leverstatus inkl ASAT, EKG och blodtryck

Under behandling: Prover efter 1 och 2 veckor och vid läkarbesök. EKG och blodtryck efter 1 vecka och vid läkarbesök

- EKG, QTc  $\leq$ 470 msec. Elektrolyter inom normalnivåer.
- Pralsetinib är en interaktionsbenägen substans som kan påverkas av och påverka effekten av andra läkemedel, se FASS.
- Kapslarna ska tas på fastande mage. Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos.
- Undvik samtidigt intag av grapefrukt och grapefruce under behandlingstiden.

### Dosereduktion

Dosen kan sänkas i steg om 100 mg en gång dagligen. Pralsetinib ska sättas ut permanent om patienten inte tolererar 100 mg dos en gång dagligen.

### Biverkningar

- Observans på luftvägssymtom.
- Hematologisk toxicitet
- Levertoxicitet
- Förstoppning och diarré. illamående, buksmärter och smakrubbningar
- Fattigue
- Huvudvärk
- Feber

### [Patientinformation](#)

**Körschema**

Att göra	
1	Skriv recept + säkerställ att patienten vet hur han/hon skall ta kapslarna. Informera om att varan kan ta tid att beställa hem från lokalt apotek.