

GI Panitumumab – Encorafenib 28 d

Kurintervall: 28 dagar

Cytodos: "GI Panitumumab 14 d"

Indikation: Generaliserad kolorektalcancer med mutation i BRAF, V600E, NRAS/KRAS wildtype som tidigare har fått systemisk behandling

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Panitumumab	6 mg/kg	1	2	i.v.	1,15
B	Encorafenib	300 mg standarddos	1	28	p.o.	1-28

Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Da g 29 ny kur	
A Panitumumab	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B Encorafenib	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

Övrigt

- EKG rekommenderas innan encorafenib sätts in, 1 månad efter behandlingsstart och därefter med ca 3-månaders intervall eller oftare om kliniskt indicerat, så länge behandlingen pågår. Värdera QTc-tid. QTc-förlängning över 500 ms är kontraindicerat (se FASS) – kontakt kardiolog.
- Risk för hypomagnesi
- Om Panitumumabdos > 1000 mg ges infusionen på 90 minuter
- Receptförskrivning av perorala tetracykliner från start
- Förebygga och behandla biverkningar EGFR-hämmare
- Behandlingen pausas vid annan biverkan av grad 3 eller 4, förutom mukositet eller hudbiverkan. Behandlingen kan i sådana fall återupptas efter individuell bedömning.
- Encorafenib skrivs på recept. Lagerförs inte på apotek utan behöver beställas vid varje recept. Inför kur 1 är det inte tvunget att starta

Encorafenib samma dag som Panitumumab om apoteket inte hinner få hem tablettarna i tid.

- Dossänkning av Encorafenib sker i två steg – 225 mg x 1 till 150 mg x 1. Se schema för kolorektalcancer, tabell 2 i FASS.
- Provtagning

Patientinformation

[Patientinformation Panitumumab-Encorafenib](#) (finns inte i kombination Panitumumab-Encorafenib men ger samma biverkningar, stryk Cetuximab)

[Hudbiverkningar vid EGFR-hämmare](#)

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Akutvagn tillgänglig		
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		-
3	Blodtryckskontroll före första dosen Panitumumab. Risk för överkänslighetsreaktion finns, särskilt vid första infusionen		
4	Ge Panitumumab spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	1 timme första behandlingen, om denna går bra ges efterföljande på 30 min.	Cytodos
5	Se till att patienten startar behandling med Encorafenib. Tas en gång om dagen, förslagsvis till kvällen med eller utan mat. 24 h timmar mellan doserna. Glömd kapsel kan tas om det inte gått mer än 12 timmar, annars ska den hoppas över		Cosmic

Anmärkningar

- Samtidigt intag av grapefruktjuice och johannesört ska undvikas