

Ultraljud dränage pleura, ascites med mera, instruktion till remittent, röntgen Region Jönköpings län

Kontraindikationer

Om blödningsparametrar avviker från gränsvärden ska åtgärder vidtas.

Förberedelser

- Patienten ska vara inneliggande, komma i renbäddad säng och vara klädd i patientkläder.
- Läkare/sjuksköterska på vårdavdelningen bedömer om smärtstillande och lugnande läkemedel behövs innan biopsi. Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta måste patienten ha någon form av premedicinering.
- Patienten ska ha en fungerande PVK.
- För information kring eventuell fasta, se ”Riktlinjer inför interventioner”.
- Provtagning enligt rutin, se ”Riktlinjer inför interventioner”.
- Utsättning av blodförtunnande läkemedel enligt rutin, se ”Riktlinjer inför interventioner”.

Hur går en undersökning till

- Patienten ska kunna ligga/sitta stilla under undersökningen, som tar cirka 30 minuter.
- Patienten ska kunna medverka och följa instruktioner.
- Området steriltvättas.
- Lokalbedövning ges.
- Aktuellt område punkteras med ultraljudsvägledning och en dränagekateter inläggs.
- Dränaget fixeras.

Remiss

- Ange eventuellt tolkbehov, se dokument ”Tolkbehov inför röntgenundersökningar”.
- Ange eventuell allergi mot lokalbedövningsmedel.
- Ange om patienten står på blodförtunnande läkemedel och om de är utsatta eller inte.

Eftervård

- Patienten ska observeras och kontrolleras fastande sängliggande på vårdavdelning enligt eftervårdsblankett (1–4 timmar)

- Dränaget lämnas vanligtvis öppet från ultraljud.

Kontakt

Röntgens kundtjänst, tfn 010-241 04 00.