

Bröst Karboplatin AUC5 - Paclitaxel 21 d

Cytodose: Kombination av två regimer: "Bröst Karboplatin AUC5, 21 d" och "Bröst Paclitaxel dos 1+2 /reaktion" eller "Bröst Paclitaxel UNDERHÅLL"

Kurintervall: 21 d

Indikation Bröstcancer, trippelnegativ

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Karboplatin	AUC=5*	1	1	i.v.	1
B	Paclitaxel	80 mg/m ²	1	3	i.v.	1,8,15

* Calverts formel Dos (mg)=(planerad AUC) x (GFR ml/min + 25).

	Substans/dag	1	8	15	Dag 22 ny cykel/kur
A	Karboplatin	A	-	-	
B	Paclitaxel	B	B	B	

Övrigt

- I regimen "Bröst Paclitaxel dos 1+2 samt om reaktion" är infusionstiden default satt till 2 timmar. Ändra manuellt i Cytodose till 1 timme om det är dos 1 eller 2 som ordinerar förutsatt att patienten inte reagerar.
- [Antiemetika:Högenmetogent](#)). Dag 8 och 15 [Lågemetogen](#) (Akynzeo delas ut av sjuksköterska, ej på recept.)
Allergiprofilax:
- T. Desloratadin 5 mg 2 tabletter 1 timme innan paclitaxel.
- T. Betapred 8 mg 1 timme innan paclitaxel dag 1 och 8 kur 1 och vid reaktion lohoxolclearance. OBS! Använd alltid det okorrigerade värdet=absolut vid dosering av karboplatin.
- Om S-Kreatinin är över normalvärde görs kontroll av njurfunktion med clearancebestämning
- Filgrastim ges enligt protokoll Nordic Trip dag 3-5, 10-12, 17-19. Ett alternativ är pegfilgrastim dag 2. Ordinerar i Cosmic och läggs till i Cytodos som separat rad.
- [Kontroll av neuropatier](#)
- [Rutinmässig provtagning](#)

Dosreduktion hematologi

Substans	Neutrofila	Neutrofila	TPK	TPK

	≥ 1,0	< 1,0	≥ 100	<100
Karboplatin	100 %	Behandlingen uppskjutes	100 %	Behandlingen uppskjutes
Paclitaxel	100 %	Behandlingen uppskjutes	100 %	Behandlingen uppskjutes

- [Patientinformation](#)
- [Högemetogen + allergi dag 1](#)
- [Allergiprofylax](#) dag 8 och 15

Körschema dag 1

Att göra	Inf tid	Var ordinerat
Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax: Desloratadin 10 mg, Betapred 8 mg, samt antiemetika inför Karboplatin		Cytodos
Akutvagn tillgänglig		-
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		
Ge Paclitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion Blodtryckskontroll före start vid de första två Paclitaxel-behandlingarna. Stanna kvar hos patienten de första 15 min av Paclitaxel-infusionen de två första behandlingarna. Om patienten har reagerat ta blodtryckskontroll innan varje start	1 timme (2 timmar om patienten reagerat)	Cytodos
Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml intravenöst	30 min	
Lämna ut G-CSF om ordinerat		Cosmic

Körschema dag 8 och 15

Att göra	Inf tid	Var ordinerat
Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax. Desloratadin 10 mg tas inför alla Paclitaxel. Betapred 8 mg endast inför de två första Paclitaxelbehandlingarna samt om patienten har reagerat.		Cytodos
Ge Paclitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion Blodtryckskontroll före start vid de första två Paclitaxel-behandlingarna. Stanna kvar hos patienten de första 15 min av Paclitaxel-infusionen de två första behandlingarna. Om patienten har reagerat ta blodtryckskontroll innan varje start	1 timme (2 timmar om patienten reagerat)	Cytodos
Lämna ut G-CSF om ordinerat		Cosmic

