

Perifer neuropati - i samband med cytostatika

Cytostatikabiverkningar från perifera nerver kan göra att du känner domningar, stickningar eller brännande känsla i huden. Andra symtom kan vara smärta i händer eller fötter eller försämrad finmotorik, exempelvis svårigheter att knäppa knappar eller svårt att gå.

Kontakta oss om du upplever nya eller förvärrade symtom på perifer neuropati. Du kan använda skattningskalan nedan. Det kan vara bra att fylla i skattningskalan inför varje behandling. Kom överens med läkaren eller sjuksköterskan vad som blir bäst.

Varför är detta viktigt? Dosen av det aktuella läkemedlet kan behöva sänkas och då är det viktigt att vi vet detta innan du kommer för att få din behandling (så att vi kan beställa rätt dos från apoteket).

I vissa fall kan behandlingen behöva avslutas, tillfälligt eller för gott. Vi kan ibland föreslå andra läkemedel eller annan behandling för att lindra symtomen.

	Nej, inte alls	Lite	En del	Mycket
Jag har domningar eller stickningar i händerna				
Jag har domningar eller stickningar i fötterna				
Jag känner obehag i händerna				
Jag känner obehag i fötterna				
Jag känner mig svag i hela kroppen				
Jag har problem med hörseln				
Det ringer eller susar i öronen				
Jag har svårt att knäppa knappar				
Jag har svårt att känna formen på små föremål som jag håller i handen				
Jag har svårt att gå				

[Patientinformation – utskriftsvänlig](#)