

Gyn Bevacizumab 7,5 mg/kg - Paclitaxel 175 mg/m² Karboplatin AUC5 21 d

Behandling

| | Substans (preparat) | Dos/administrerings-tillfälle | Antal administrerings-tillfällen/dygn | Doser/cykel/kur | Adm | Dag |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|-----|
| A | Bevacizumab | 7,5 mg/kg | 1 | 1 | i.v. | 1 |
| B | Paclitaxel | 175 mg/m ² | 1 | 1 | i.v. | 1 |
| C | Karboplatin | AUC 5* | 1 | 1 | i.v. | 1 |

* Calverts formel Dos (mg)=(planerad AUC) x (GFR ml/min + 25)

| | Substans/dag | 1 | Paus dag 2-21 | Dag 22 ny kur |
|---|--------------|---|---------------|---------------|
| A | Bevacizumab | A | - | |
| B | Paclitaxel | B | - | |
| C | Karboplatin | C | - | |

[Proteinuri och hypertension vid VEGF-behandling](#)

Regimkombinationen finns inte på Regimbiblioteket RCC

[Patientinformation Bevacizumab](#)

[Patientinformation Karboplatin-Paclitaxel](#)

[Patientinformation antiemetika och allergiprofylax](#)

Körschema dag 1

| Att göra | Inf tid | Var ordinerat |
|---|---------|---------------|
| Ge eller kontrollera att patienten tagit allergiprofylax samt antiemetika | | Cytodos |
| Akutvagn tillgänglig | | - |

| | | |
|---|----------|---------|
| Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel | | - |
| Kontrollera blodtryck, se länk ovan | | |
| Ge Bevacizumab spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml | 30 min | Cytodos |
| Ge Paclitaxel spädd i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion. Blodtryckskontroll före start vid de 2 första behandlingarna. Stanna kvar hos patienten de första 15 min av infusionen de 2 första behandlingarna. Om patienten har reagerat ta blodtryck före varje start. | 3 timmar | Cytodos |
| Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glucos 50 mg/ml som intravenös infusion | 30 min | Cytodos |