

GI Panitumumab-Irinotekan 14 d

Kurintervall: 14 dagar

Indikation: Palliativ behandling metastaserad kolorektalcancer, RAS vildtyp

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/kur	Adm	Dag
A	Panitumumab	6 mg/kg	1	1	i.v.	1
B	Irinotekan	180	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Paus dag 2-14	Dag 15 ny kur
A	Panitumumab	A	-	
B	Irinotekan	B	-	

Övrigt

- Receptförskrivning av perorala tetracykliner från start
- Risk för hypomagnesemi vid behandling med Pantumumab
- Vid dos över 1000 mg ges Panitumumab under 90 min.
- Antiemetika, medelemetogen
- Att förebygga och behandla hudbiverkningar av EGFR-hämmare
- Irinotekan - premedicinering: ge subkutant Atropin 0,25 mg för att förebygga akut kolinerget syndrom. Om symptom uppstår, ge ytterligare subkutant Atropin 0,25-0,50 mg.
- Var särskilt observant vid diarréer och feber. Kan kräva inläggning.
- Provtagning, rutinmässig

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC-gradering för Panitumumab

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid tox grad 0-I	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen

Grad III	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

Dosreduktion hudreaktioner och mjukvävnadstoxicitet

Förekomst av hudsymtom \geq grad 3 (svårare än eller motsvarande grad 3 definieras som intolerabla, allvarliga eller livshotande)	Administrering av Panimumab	Utfall	Dosreglering
Initial förekomst	Hoppa över 1 eller 2 doser och behandla enligt PM	Förbättrat <grad 3	Ge 100 % vid nästa tillfälle
		Inte förbättrat	Avbryt
Vid andra förekomsten	Hoppa över 1 eller 2 doser och behandla enligt PM	Förbättrat <grad 3	Ge 80 % vid nästa tillfälle
		Inte förbättrat	Avbryt
Vid tredje förekomsten	Hoppa över 1 eller 2 doser och behandla enligt PM	Förbättrat <grad 3	Ge 60 % vid nästa tillfälle
		Inte förbättrat	Avbryt
Vid fjärde förekomsten	Avbryt		

Dosreduktion hematologi

Neutrofila	TPK	Irinotekan
$\geq 1,5$	≥ 100	100 %
	75-99	50-75 %
$< 1,5$	< 75	Behandlingen uppskjutes 3-7 dagar. Överväg dosreduktion vid nästa kur.

Patientinformation

Antiemetikaschema: Medelemetogen

Patientinformation Panitumumab

Patientinformation Irinotekan

Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1 Kontrollera att patienten tagit antiemetika		Cytodose
2 Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		-

3	Akutvagn tillgänglig		-
4	Blodtryckskontroll före start första behandlingen. Risk för överkänslighetsreaktion finns, särskilt vid första infusionen.		-
5	Ge Panitumumab spädd i 100 Natriumklorid 9 mg/ml	1 timme (ges på 30 minuter om första infusionen gått komplikationsfritt)	Cytodos
6	Ge subcutan injektion av Atropin (ca 30 min före irinotekan)		Cytodos
7	Ge Irinotekan spädd i 500 Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodos