

Lung Atezolizumab 1875 mg subcutant 21d

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: Lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer efter tidigare behandling med kemoterapi, PD L1 negativa kan ändå ha nytta av behandlingen.

Adjuvant post. op vid PDL1 50 % eller mer, stadium II-IIIa inte EGFR-muterad eller ALK-positiv.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Atezolizumab (Tecentriq)	1875	1	1	s.c.	1

	Substans/dag	1	Paus dag 2-21	Dag 22 ny cykel
A	Atezolizumab (Tecentriq)	A	-	

Behandlingen pågår tills patienten progredierar eller får biverkningar som kräver utsättning

Övrigt

- Alternativ till i.v Atezolizumab
- För immunorelaterade biverkningar: [Biverkningshantering](#) och [Kontaktuppgifter till konsult](#)
- Patient med TB eller Hepatit-anamnes, kontakta infektion.
- Vid infusionsreaktion som t.ex. feber, frossa eller värk bör Paracetamol 1000 mg och Desloratadin 5 mg ges. Detta kan också övervägas att ges som premedicinering inför behandlingar därefter.
- Dosreduceras ej. Avstå från behandlingstillfälle vid toxicitet.
- [Provtagning immunoterapi singel](#)

Biverkningar

Grad I	Symtomatisk behandling
Grad II	Uppehåll med behandling. Steroid behandling motsvarande Prednisolon 1-2 mg/kg per dag. Reduceras när biverkningar är grad I, minst 4 veckors steroidbehandling
Grad III- IV	Behandlingen utsättes permanent. Metylprednisolon i.v. 125 mg dag 1, därefter Prednisolon 1-2 mg/kg per dag p.o. Om ej svar på prednisolon ge Infliximab

	(Remicade) 5 mg/kg x 1
--	------------------------

Biverkningar ska rapporteras som Events of Clinical Interest och SAE -via Bosse eller Therese

[Patientinfo](#)

Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
Akutvagn tillgänglig. Ta ut ampullen ca 30 minuter innan så den blir rumstempererad.		
Atezolizumab 15 ml injiceras subkutan i låret via butterflykanyl. Nyp ihop huden och ge 0,5- 1ml vänta sen 30 s och ge sedan resten. Administrera INTE lösningen som finns kvar i slangen till patienten. Injektionsstället ska alterneras mellan vänster och höger lår.	7 minuter	Cytodose
Patienten ska stanna kvar 15 minuter efter behandlingen för observation		

Man kan ta ut vialen och sen kan den läggas tillbaka. Den får stå i rumstemperatur sammanlagt högst 4 timmar.

Telefonkontakt med patienten en vecka efter första behandlingen avseende biverkningar, därefter individuell bedömning.