

GI Imatinib (Glivec) p.o.

Indikation: GIST (gastrointestinal stromacellstumör). Palliativ, neoadjuvant/adjuvant

Kurintervall: kontinuerlig

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Kontinuerlig	Adm	Dag
A	Imatinib (Glivec)	400	1	Kontinuerlig	per oralt	

Behandlingen skall fortsätta så länge klinisk nytta erhålls eller till oacceptabla biverkningar uppträder.

Dosreduktion, se [FASS](#)

Icke hematologiska biverkningar: Sätt ut behandlingen tills biverkningarna har försvunnit. Därefter kan behandlingen återupptas. Om bilirubin ökar >3 ggr det övre gränsvärdet eller ASAT/ALAT ökar >5 ggr det övre gränsvärdet ska Glivec sättas ut tills bilirubinet återgår till <1.5 ggr det övre gränsvärdet och transaminaserna sjunkit till <2.5 ggr det övre gränsvärdet. Behandlingen kan återupptas med något reducerad dos t.ex. 300 mg och eskaleras så fort som möjligt till 400 mg.

Hematologiska biverkningar:

Om neutrofila <1.0 eller TPK < 50, avbryt behandlingen. Behandlingen kan återupptas när neutrofila ökat till > 1.5 och TPK > 75. Om problemet uppstår igen, upprepa samma åtgärd och ge Glivec reducerat till 300 mg.

Övrigt

- [Provtagning, rutinmässig](#)
- Kontrollera vikt vid varje mottagningsbesök
- Om tumörväxt i ventrikel eller tarmvägg finns, sätt patienten på syrahämmande medel
- Vanligt med kretininstegring. Vid kreatininstegring mer än 30 % och om kreatinin är över normalgränsen, överväg dosreduktion.
- Sjuksköterska kontrollerar prover och kontaktar läkare vid avvikande provsvar (rödmarkerat i BoS eller enligt journaltext). Patienten får ingen bekräftelse på proverna så länge de är normala. Vid minsta tveksamhet ska sjuksköterska kontakta läkare; 1. PAL, 2. Cytordinatör, 3. Dagjour.

Patientinformation (ändra diagnos)**Körschema**

	Att göra	Var ordinerat
1.	Informera patient om behandlingen: Provförpackning, recept, biverkningar, provtagning och uppföljning (boka återbesök till läkare efter 4 veckors behandling)	Cosmic
2.	Lägg in bevakning för blodprovstagning 1 gång/vecka den 1:a månaden	
3.	Tabletterna tas tillsammans med måltid och ett stort glas vatten	