

Uro Sunitinib (Sutent) p.o. 42 d

Cykellängd: 42 dagar (6 veckor)

Indikation: Njurcellscancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Dygns dos	Adm
A	Sunitinib	50	1	50	per oralt

	Substans/dag	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	Sunitinib*	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	Substans/dag	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Paus dag 29-42	Dag 43 ny cykel
A	Sunitinib*	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	

* Alt. individuellt upplagt doseringsintervall av ansvarig läkare

Övrigt

- [Provtagning, rutinmässig](#)
- Sjuksköterska kontrollerar prover och meddelar patienten att proverna är bra och när ny kur ska starta. Vid avvikande prover (rödmarkerat i BoS eller enligt journaltext) ska sjuksköterska kontakta läkare. Vid minsta tveksamhet ska sjuksköterska kontakta läkare; 1. PAL, 2. Cytordinatör, 3. Dagjour.
- Blodtryck 1 ggr/vecka i 4 veckor, sedan 1 ggr/ månad. Patienten kan ta blodtryck på vårdcentralen alt. med egen blodtrycksmätare i hemmet. Be patienten höra av sig till kontaktsjuksköterska om blodtrycket överskrider 160/100 mmHg.
- Interaktioner, se [FASS](#)
- Perukremiss övervägs
- [Att förebygga och behandla hand-fotsyndrom](#)

Biverkningmonitorering, [Checklista](#)

[Patientinformation \(21 dagar med paus\)](#)

- [Patientinformation Sunitinib \(Sutent\)](#)

Start

	Att göra	Var ordinerat
1.	Informera patient om behandlingen. Biverkningar, provtagning och uppföljning. Hur patienten ska sköta läkemedelsbehandling	
2.	Skicka med tabletter från läkemedelsförråd på mottagningen, för en månads förbrukning.	Cosmic

Uppföljning

	Att göra	Var ordinerat
1.	Tablettbehandling, compliance Planera återbesök vid behov	
2.	Skicka med tabletter från läkemedelsförråd på mottagningen, för en månads förbrukning. Därefter om patienten mår väl, sköts uttag av tabletter av patienten	Cosmic
3.	Om patienten avbryter behandlingen - be henne/honom att ta med resterande läkemedel tillbaka (enligt rutiner för kliniska prövningar)	

Anmärkningar

- Tabletterna kan tas oberoende av måltid
- Grapefrukt, grapefruktjuice och johannesörtspreparat får ej intas under vid behandling
- Information; uppmärksam på hand - fot syndrom och huvudvärk (blodtrycksstegring)