

GI FOLF 14 d

Kurintervall: 14 dagar

Indikation: Metastaserande colorektalcancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Kalciumfolinat	200	1	1	i.v.	1
B	Fluorouracil (5-FU)	400	1	1	i.v.	1
C	Fluorouracil (5-FU) via homepump	2400	- (Infusionstid ca 48 timmar)	1	i.v.	1-2

	Substans/dag	1	2	Paus dag 3-14	Dag 15 ny cykel/kur
A	Kalciumfolinat	A	-	-	
B	Fluorouracil	B	-	-	
C	Fluorouracil	C	C	-	

Övrigt

- Testa för DPYD-brist innan behandling ges.
- [Antiemetika lägemetogen](#)
- [Provtagning, rutinmässig](#)

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid tox grad 0-I	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen

Grad III	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

[Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling av fluorouracil](#)

Dosreduktion hematologi

Neutrofila	TPK	Fluorouracil	Calciumfolinat
> 1,5	>75	100 %	100 %
1,1 - 1,5	50 - 75	50-75 %	Samma % som 5-Fu
≤ 1,0	< 50	Behandlingen uppskjutes en vecka. Överväg dosreduktion vid nästa kur.	

- [Patientinformation FOLF](#)
- [Homepump vid cytostatikainfusion](#)

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
2	Sätt spoldropp 250 ml natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		
3	Ge Calciumfolinat spädd i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	1 timme	Cytodose
8	Ge Fluorouracil spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	5-10 min	Cytodose
9	Sätt homepump med Fluorouracil intravenöst	ca 48 timmar	Cytodose