

GI FLIRI 14 d

Kurintervall: 14 dagar

Indikation: GI, metastaserande colorektalcancer, ventrikeltcancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Irinotekan	180	1	1	i.v.	1
B	Fluorouracil (5-FU)	500	1	2	i.v.	1,2
C	Kalciumfolinat	60	1	2	i.v.	1,2

	Substans/dag	1	2	3-14	Dag 15 ny cykel/kur
A	Irinotekan	A	-	-	
B	Fluorouracil	B	B		
C	Kalciumfolinat	C	C	-	

Övrigt

- Testa för DPYD-brist innan behandling ges.
- Irinotekan - premedicinering: ge subkutant Atropin 0,25 mg för att förebygga akut kolinergt syndrom. Om symtom uppstår, ge ytterligare subkutant Atropin 0,25 - 0,50 mg.
- [Antiemetika, medelemetogen](#)
- Var särskilt observant vid diarréer och feber. Kan kräva inläggning.
- [Provtagning, rutinmässig](#)

Dosreduktion hematologi

Neutrofila	TPK	Fluorouracil	Irinotekan	Calciumfolinat
≥ 1,5	≥100	100 %	100 %	100 %
	75-99	50-75 %	50-75 %	100 %
< 1,5	<75	Behandlingen uppskjutes 3-7 dagar. Överväg dosreduktion vid nästa kur.		

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC-gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen

Grad II	Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid tox grad 0-I	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen
Grad III	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

[Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling av fluorouracil](#)

- [Medelemetogent](#)
- [Patientinformation FLIRI](#)

Körschema Dag 1

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika		
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		-
3	Ge sc injektion av Atropin, (ca 30 min före Irinotekan)		Cytodose
4	Ge Irinotekan spädd i 500 Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose
5	Ge Fluorouracil spädd i 50-100 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	5-10 minuter	Cytodose
6	Paus, låt spoldroppet gå	30 minuter	
7	Ge Kalciumfolinat som intravenös bolus injektion	2-3 minuter	Cytodose

Körschema Dag 2

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika		
2	Sätt spoldropp 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml		-
3	Ge Fluorouracil spädd i 50-100 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	5-10 minuter	Cytodose
4	Paus, låt spoldroppet gå	30 minuter	
5	Ge Kalciumfolinat som intravenös bolus injektion	2-3 minuter	Cytodose