

Retentio testis

Vårdnivå och samverkan

Hos alla pojkar ska undersökning av testiklarna ske på BB samt på BHV vid varje läkarbesök. Vid avvikande fynd bedömning av barnläkare på BUMM enligt nedan.

Diagnostik och utredning

Diagnos genom palpation av testiklar. För undersökningsteknik och diagnostiska kriterier, se Undersökning av testiklar, Rikshandboken i barnhälsovård under Relaterat.

- Bilateralt icke palpabel testikel. Vid upptäckt hos nyfödd, omedelbar kontakt med barnläkare, barnkliniken för utredning av avvikande könsdifferentiering etc. Vid upptäckt senare skrivs remiss till BUMM.
- Retentio testis bedöms av barnläkare, BUMM, efter 6 månaders ålder. Remiss skrivs av barnläkare till kirurgmottagning för operation. Enligt rikshandboken skrivs remiss från BHV vid 6 månaders ålder, då det är sällsynt att testiklar vandrar ned efter 6 månaders ålder, men vanligt att de gör det innan.
- Retraktil testikel. Remitteras till barnläkare efter 6 månaders ålder. Följs årligen i 3 år, och därefter vartannat år tills barnen närmar sig pubertet.

Patientinformation

Se Testikel som inte kommit ner i pungen, 1177 under Relaterat innehåll.