

Bröst Nab-Paclitaxel 100 mg/m² 7 d

Cytodose: "Bröst Nab-Paclitaxel 100 mg/m²" Kurintervall: 7 d

Indikation: Palliativ vid kombinationsbehandling och reaktion på paclitaxel

Behandling

	Substans(preparat)	Dos/administrerings- tillfälle	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Nab-Paclitaxel	100 mg/m ²	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Dag 8 ny cykel/kur
A	Nab-Paclitaxel	A	

Övrigt

- [Antiemetika lågemetogen](#)
- Monitorera perifer neuropati, hudtoxicitet och mukositt/diarréer. Se FASS för specifika råd om dosreduktioner/uppehåll vid grad 2-4 toxicitet.
- Dosreduktion avseende hematologi individanpassas
- [Provtagning](#)

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	TPK
	<1,0	< 100
Nab-Paclitaxel	Behandlingen uppskjutes	Behandlingen uppskjutes

[Patientinformation](#) (21 d)

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter		Cytodose
4	NabPaclitaxel späds i Natriumklorid 9 mg/ml, beroende på	20 minuter,	Cytodose

<p>NabPaclitaxeldos varierar volymen i påsen. Apoteket tillsätter aktuell volym till en tom steril påse, och skriver på etiketten hur många ml som påsen innehåller. Starta Nab-Paclitaxelinfusionen och spola snabbt in max 20 ml, detta för att fylla aggregatet med verksam substans.</p>	<p>därefter 20 ml Nacl på 10 min.</p>	
--	---	--