

Lung Cyklofosamid, interstitiell sjukdom – UNDER ARBETE

Cykellängd x dagar

Indikation

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Cyklofosamid (Sendoxan)	1000 mg????	1	1	i.v.	1
B	Solu-Medrol	1000 mg	1	1	i.v	1

	Substans/dag	1	Dag x behandlingssuppehåll	Dag y ny cykel
A	Cyklofosamid	A	-	

Övrigt

- Antiemetika. Skicka med patienten 1 tablett (8 mg) Ondansetron hem. Uppmana patienten att ta denna ca 1-2 timmar före behandling nummer 1. Om patienten har glömt ta sin antiemetika. Ge injektion Ondansetron (Zofran) 2 mg/ml, 4 ml (dvs 8 mg) innan start av Sendoxan.
- Ordinerar Uromitexan injektion 200 mg/ml 1 ml (200 mg)???? inför start av Cyklofosamid. Ordinerar även tablett Uromitexan 400 mg, 4 timmar respektive 8 timmar efter start av cyklofosamidinfusion. stämmer doserna?

Dosreduktion (Magnus?)

???

Patientinformation

???

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1.	Kontrollera att patienten tagit antiemetika inför behandlingen,		Cosmic

	alternativt ge tablett ondansetron när patienten kommer till enheten		
2	Ge Solu-Medrol 1000 mg spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst	30 min	Cosmic
3	Ge injektion Uromitexan 200 mg/ml 1 ml (dvs 200 mg) spädd med 9 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst		
4	Ge Cyklofosfamid spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30-60 min????	Cosmic
6	Sätt efterdropp, 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	60 min	
7	Patienten tar tablett Uromitexan 400 mg, 4 timmar efter start av cyklofosfamidinfusion		Cosmic
8	Patienten tar tablett Uromitexan 400 mg, 8 timmar efter start av cyklofosfamidinfusion		Cosmic

Anmärkningar

- Provtagning skall ske 1-3 dagar innan behandling. Blodstatus, SR, CRP, krea, kalium, Natrium, ASAT, ALAT, u-sticka.
- Patienten går hem efter avslutat spoldropp
- Uppmana patienten att dricka rikligt peroralt (2 liter) dygnet när cyklofosfamid givits
- Om patienten glömt en dos, be henne/honom att ta den så snart de kommer på detta. Det är bra att veta att pga att Cyklofosfamiddosen är (relativt sett) låg så är INTE informationen i bipacksedeln (att man omedelbart behöver kontakta sjukvården om man glömt en dos) applicerbar.
- Skicka med tablett Uromitexan 400 mg så att det räcker till de doser patienten tar hemma