

Everolimus (Afinitor) - biverkningar gradering

	Grad 0	Grad 1	Grad 2	Grad 3	Grad 4
Icke infektiös pneumonit	0	0 symtom, radiologiskt fynd	Symtomgivande utan att hindra dagliga aktiviteter	Hindrar dagliga aktiviteter, syrgas nödvändig	Livshotande
Stomatit	0	Erytem utan smärta, kan äta normal kost	Symtomgivande (smärta, sår, svullnad) men kan äta och svälja anpassad kost	Symtomgivande och oförmögen att inta föda och vätska oralt	Sjukhusvård
Smakförändringar	0	Förändrad smak, ingen förändring i matintag	Förändrad/obehaglig/förlorad smak eller förändring i matintag		
Hudreaktioner	0	Milda, ingen behandling behövs	Lättare obehag som lindras av behandling	Svåra obehag och smärta	Sjukhusvård
Illamående	0	Lätt illamående, minskad aptit, ingen förändring i matvanor	Påtagligt illamående. Minskat matintag utan viktninskning	AT påverkan. Otillräckligt kalori- och vätskeintag	Livshotande
Kräkning	0	1 ggr/ dag	2-5 ggr/ dag	6-10 ggr/ dag	Sjukhusvård
Feber	0	37,0-38,0	38,1-40,0	> 40,0	
Perifera ödem	0	Lätta	Måttligt, svårt med på-/avsättning av skor/ ringar	Svårt påverkar ADL	>40,0 i > 24 tim
Aktivitet	0	Lättare fysisk begränsning, klarar lättare arbete och hushållssysslor	Hemmagående, klarar ADL, Uppegående > 50 % av vaken tid	Klarar inte ADL, sängbunden > 50 % av vaken tid	Sängbunden, sjukhusvård