

## Bröst Paclitaxel palliativt 28 d

Cytodos: "Bröst Paclitaxel dos 1+2 /reaktion" "Bröst Paclitaxel UNDERHÅLL"

Kurintervall 28 dagar

Indikation: Bröstcancer - palliativ

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m <sup>2</sup>	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/kur	Adm	Dag
A	Paclitaxel	80*	1	3	i.v.	1, 8, 15

	Substans/dag	1	8	15	Dag 29 ny kur
A	Paclitaxel	A	A	A	

### Övrigt

I regimen "Bröst Paclitaxel dos 1+2/reagerat" är infusionstiden default satt till 2 timmar. Ändra manuellt i Cytodos till 1 timme om det är dos 1 eller 2 som ordineras förutsatt att patienten inte reagerar.

Ordinera "Bröst Paclitaxel UNDERHÅLL" vid dos 3 förutsatt att patienten ej reagerat vid tidigare doser.

[Kontroll av perifer neuropati](#)

[Antiemetika vid behov](#)

[Provtagning](#)

### Dosreduktion

Substans	Neutrofila	TPK
	<1,5	< 100
Paclitaxel	Behandlingen utgår, överväg dosreduktion nästa gång	Behandlingen utgår, överväg dosreduktion nästa gång

[Patientinformation](#)

[Allergiprofylax](#)

**Körschema Paclitaxel kur 1, dag 1 och 8 samt om patienten har reagerat vid tidigare tillfällen**

Att göra	Inf tid	Var ordinerat
Ge eller kontrollera att patienten tagit allergiprofylax  Ge T. Desloratadin 5 mg 2 tabletter 1 timme innan paclitaxel Ge T. Betapred 8 mg 1 timme innan paclitaxel		
Akutvagn tillgänglig		-
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel Blodtryckskontroll före start vid de första två behandlingarna. Stanna kvar hos patienten de första 15 min av infusionen de två första behandlingarna. Om patienten har reagerat ta blodtryckskontroll innan varje start. Inga rutinmässiga blodtryckskontroller vid underhållsdos		
Ge Paclitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	2 timmar (om patienten reagerat) (1 timme dos 1+2)	Cytodose

**Körschema Paclitaxel UNDERHÅLLSDOS**

Att göra	Inf tid	Var ordinerat
Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax  T. Desloratadin 5 mg 2 tabletter 1 -3 timmar innan paclitaxel		-
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel Blodtryckskontroll före start vid de första två behandlingarna. Stanna kvar hos patienten de första 15 min av infusionen de två första behandlingarna. Om patienten har reagerat ta blodtryckskontroll innan varje start. Inga rutinmässiga blodtryckskontroller vid underhållsdos		
Ge Paclitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	1 timme	Cytodose