
Cosmic Läkemedel, ordinera och administrera warfarin, rekommendation

Rekommendationen gäller både för läkare som förskriver/ordinerar warfarin samt för vårdpersonal som ska administrera läkemedlet. Detta arbetssätt gör det möjligt att hantera warfarinordinationer på samma sätt oavsett om patienten är inom öppen- eller slutenvård.

Läkare

Vid behandlingstart med warfarin, använd läkemedelsmall warfarin eller Waran. Båda innehåller ett villkor vilket innebär att doseringen i Cosmic och på förskrivning blir ”? Tablett kl 20 tills vidare, Dosering enligt AK-mottagningens lista”.


Sökresultat: 2 Mallar

Behandlingsorsak	Mallnamn	Produkt
Motverkar blodproppsbildning	PED Waran 2,5 mg tabl; ?kl 20tv (antikoagulantia, tromboembolism, warfarin)	Waran
Motverkar blodproppsbildning	PED Warfarin 2,5 mg tabl; ?kl 20tv (vit Waran, antikoagulantia, tromboembolism)	Warfarin Orion

I slutenvård visas ? vid varje utdelningstillfälle efter att läkemedelslistan är godkänd för administrering. För att ange dos, högerklicka på utdelningstillfället i **Läkemedelslistan** och välj ***Ändra dos***. Ange dos och klicka på ***Ändra dos***. **Läkemedelslista/Utdelningsvy** visar nu angiven dos istället för ?.

Sjuksköterska/barnmorska

1. Är dos redan angiven av läkare, administrera som vanligt.
2. Visas ?, kontrollera med läkare vilken dos som ska ges. Högerklicka och välj ***Administrera***. Ange administrerad dos samt skriv ordinerande läkares namn i fältet för kommentar. Klicka på ***Administrera***.
3. När en dos ska anges men inte administreras, välj istället ***Anteckning*** i högerklicksmenyn. Skriv dos samt ordinerande läkare i fältet för kommentar. Klicka på ***Anteckning***. I **Läkemedelslista/Utdelningsvy** visas en pratbubbla på utdelningstillfället för att visa att en kommentar finns. Den som sedan ska administrera, högerklickar och väljer ***Administrera***. Kommentaren visas längst ner i Log i **Registreradialogen**.

Obs! Det är i första hand läkaren som ska ange dosen.