

Cosmic Läkemedel, ordinera och administrera warfarin, rekommendation

Rekommendationen gäller både för läkare som förskriver/ordinerar warfarin samt för vårdpersonal som ska administrera läkemedlet. Detta arbetssätt gör det möjligt att hantera warfarinordinationer på samma sätt oavsett om patienten är inom öppen- eller slutenvård.

Läkare

1. Vid behandlingstart med warfarin, använd läkemedelsmall warfarin eller Waran. Båda innehåller ett villkor vilket innebär att doseringen i Cosmic och på förskrivning blir ””? Tablett kl 20 tills vidare, Dosering enligt AK-mottagningens lista”.

Sökrresultat: 2 Mallar

Behandlingsorsak	Malinamn	Produkt
Motverkar blodproppsbildning PED Waran 2,5 mg tabl; ?kl 20v (antikoagulantia, tromboembolism, warfarin)	Waran	
Motverkar blodproppsbildning PED Warfarin 2,5 mg tabl; ?kl 20v (vit Waran, antikoagulantia, tromboembolism)	Warfarin Orion	

2. I slutenvård visas ? vid varje utdelningstillfälle efter att läkemedelslistan är godkänd för administrering. För att ange dos, högerklicka på utdelningstillfället i **Läkemedelslistan** och välj **Ändra dos**. Ange dos och klicka på **Ändra dos**. **Läkemedelslista/Utdelningsvy** visar nu angiven dos istället för ?.

Sjuksköterska/barnmorska

1. Är dos redan angiven av läkare, administrera som vanligt.
2. Visas ?, kontrollera med läkare vilken dos som ska ges. Högerklicka och välj **Administrera**. Ange administrerad dos samt skriv ordinerande läkares namn i fältet för kommentar. Klicka på **Administrera**.
3. När en dos ska anges men inte administreras, välj istället **Anteckning** i högerklicksmenyn. Skriv dos samt ordinerande läkare i fältet för kommentar. Klicka på **Anteckning**. I **Läkemedelslista/Utdelningsvy** visas en pratbubbla på utdelningstillfället för att visa att en kommentar finns. Den som sedan ska administrera, högerklickar och väljer **Administrera**. Kommentaren visas längst ner i Log i **Registreradialogen**.

Obs! Det är i första hand läkaren som ska ange dosen.