

Cosmic Läkemedel, ordinera och administrera warfarin, rekommendation

Rekommendationen gäller både för läkare som ordinerar warfarin samt för vårdpersonal som ska administrera läkemedlet. Detta arbetssätt gör det möjligt att hantera warfarinordinationer på samma sätt oavsett om patienten är inom öppen- eller slutenvård.

Läkare

1. Vid behandlingstart med warfarin, använd läkemedelsmall warfarin eller Waran. Båda innehåller ett villkor vilket innebär att doseringen i Cosmic och på recept blir ”? Tablett kl 20 tills vidare, Dosering enligt AK-mottagningens lista”.

Sökrresultat: 2 Mallar			
Behandlingsorsak	Malnamn	Produkt	
Motverkar blodproppsbildning PED Waran 2,5 mg tabl, ?kl 20v (antikoagulantia, tromboembolism, warfarin)	Waran		
Motverkar blodproppsbildning PED Warfarin 2,5 mg tabl, ?kl 20v (vit Waran, antikoagulantia, tromboembolism)	Warfarin Orion		

2. I slutenvård visas ? vid varje utdelningstillfälle efter att läkemedelslistan är godkänd för administrering. För att ange dos, högerklicka på utdelningstillfället i **Läkemedelslistan** och välj **Ändra dos**. Ange dos och klicka på **Ändra dos**. **Läkemedelslista/Utdelningsvy** visar nu angiven dos istället för ?.

Sjuksköterska/barnmorska

1. Är dos redan angiven av läkare, administrera som vanligt.
2. Visas ?, kontrollera med läkare vilken dos som ska ges. Högerklicka och välj **Administrera**. Ange administrerad dos samt skriv ordinerande läkares namn i fältet för kommentar. Klicka på **Administrera**.
3. När en dos ska anges men inte administreras, välj istället **Anteckning** i högerklicksmenyn. Skriv dos samt ordinerande läkare i fältet för kommentar. Klicka på **Anteckning**. I **Läkemedelslista/Utdelningsvy** visas en pratbubbla på utdelningstillfället för att visa att en kommentar finns. Den som sedan ska administrera, högerklickar och väljer **Administrera**. Kommentaren visas längst ner i Log i **Registreradialogen**.

Obs! Det är i första hand läkaren som ska ange dosen.