

Gyn Paclitaxel - Cisplatin – Bevacizumab 21d Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/ku- r	Ad- m	Da- g
A	Bevacizumab	15 mg/kg	1	1	i.v.	1
B	Paclitaxel	135 mg/m ²	1	1	i.v.	1
C	Cisplatin	50 mg/m ²	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Paus dag 2-21	Dag 22 ny cykel
A	Bevacizumab	A	-	
B	Paclitaxel	B	-	
C	Cisplatin	C	-	

Regimen finns inte på Regimbiblioteket RCC

[Antiemetika och allergiprofylax](#)

Körschema

Att göra	Inf tid	Var- ordinerat
Ge eller kontrollera att patienten tagit allergiprofylax		
Akutvagn tillgänglig		-
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		-
Ge Bevacizumab spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	30 min	Cytodose
Ge Paclitaxel spädd i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion och ge 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml som prehydrering parallellt samt ge antiemetika	3 timmar	Cytodose
Ge Cisplatin spädd i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	1 timme	Cytodose

Ge 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion - posthydrering	1-2 timmar	
--	---------------	--