

Bedömning av Antiemetikabehov

Använd dokumentet inför den första behandlingen med cytostatika, för att få ett underlag för en första bedömning om patientens behov av antiemetika. En patient som fått för lite antiemetika och mått illa efter första behandlingen har mycket stor risk att drabbas av betingat illamående, därför är det viktigt att redan från start ge så god/optimal antiemetisk behandling som möjligt.

- **HÖGRISK:** 3 poäng eller mer
- **Standard:** 0 – 2 poäng
- Vid högriskpoäng ska/bör man fundera över om patienten redan från behandlingsstart bör/ska få nästa steg i antiemetikaschemat
- Standardrisk anger att man följer de rekommendationer som anges lokalt för den ordinerade regimen

RISKFAKTORER	JA = 1 poäng	Kommentar
Patient under 60 år		
Kvinna		
Tidigare graviditetsillamående /åksjuka/sjösjuka eller Illamående vid tidigare cytostatikabehandling/ narkos		
Funktionellt status ECOG/WHO* 0 - 1 = 0 p 2 - 4 = 1 p		
Ångest/oro sedan tidigare		
Stor tumörbörda framför allt i buken t.ex. spridd kolorektalcancer		
Summa:		

* 0 = full daglig aktivitet

1 = uppegående, klarar endast lätt arbete

2 = klarar ej arbete men ADL. Sängliggande mindre än 50%

3 = begränsad ADL. Sängliggande mer än 50%

4 = helt sängliggande. Hjälp med all ADL