

Uro Cisplatin – Gemcitabin dag 1+8 21 d

Cytodose "Uro Cisplatin 35mg/m²- Gemcitabin 21d, dag 1, 8"

Kurlängd 21 dagar

Indikation

Alternativ vid urinblåscancer vid GFR mellan 50 - 60. Neoadjuvant, palliativt.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Gemcitabin	1000	1	2	i.v.	1, 8
B	Cisplatin	35	1	2	i.v.	1, 8

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	Paus dag 9-21	Dag 22 ny cykel
A	Gemcitabin	A	-	-	-	-	-	-	A	-	
B	Cisplatin	B	-	-	-	-	-	-	B	-	

Övrigt

- [Antiemetika; högemetogen](#)
- Audiogram
- Iohexolclearance
- [Perifier neuropati - monitorering](#)
- Aminoglykosider skall ej ges under och 1 månad efter cisplatinbehandling
- Vid påtaglig hörselnedsättning eller tinnitus överväg att ersätta cisplatin med karboplatin.
- [Provtagning](#)

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Återuppta (fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen
Grad III	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

Dosreduktion hematologi

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,5	<100
Båda preparaten	Behandlingen skjuts upp en vecka.	Behandlingen skjuts upp en vecka.

[Patientinformation \(stryk gallvägscancer\)](#)

[Patientinformation Antiemetika](#)

Körschema dag 1 + 8

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning efter respektive läkemedel		
2	Kontrollera att patienten tagit antiemetika		Cytodos
3	Prehydrering 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	2 timmar	Cytodos
4	Ge Gemcitabin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion. Ges parallellt med prehydreringen	30 minuter	Cytodos
5	Ge Cisplatin spädd i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	1 timme	Cytodos
6	Posthydrering 1000ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	1 timme	Cytodos

Anmärkningar

Vid viktökning eller minskad diures ställningstagande till Furosemid.