

## Uro Karboplatin 21 d

Cytodose= "Uro Karboplatin 21d"

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: Seminom, adjuvant behandling 1-2 cyklar/kurer

### Behandling

|   | Substans (preparat)      | Dos/administrerings-tillfälle, | Antal administrerings-tillfällen/dygn | Doser/cykel/kur | Adm  | Dag |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|-----|
| A | Karboplatin (Paraplatin) | AUC=7*                         | 1                                     | 1               | i.v. | 1   |

\*Calverts formel Dos (mg) = (planerad AUC) x (GFR ml/min + 25).

|   | Substans/dag | 1 | 2-21 beh. uppehåll | Dag 22 ny cykel/kur |
|---|--------------|---|--------------------|---------------------|
| A | Karboplatin  | A | -                  |                     |

### Övrigt

- [Antiemetika, högemetogen](#) -(Akynzeo delas ut av sjuksköterska, ej på recept.)
- Infertilitet beaktas, spermanedfrysning rekommenderas.
- Iohexolclearance. OBS! Använd alltid det okorrigerade värdet vid dosering av karboplatin.
- [Provtagning](#)

### Dosreduktion hematologi

| Substans    | Neutrofila                       | TPK                              |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
|             | < 1,0                            | < 100                            |
| Karboplatin | Behandlingen uppskjutes en vecka | Behandlingen uppskjutes en vecka |

### Patientinformation

- [Patientinformation Karboplatin](#)
- [Antiemetikaschema Högemetogen](#)

### Körschema

| Dag 1 | Att göra                                                                             | Infusionstid | Var ordinerat |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1     | Kontrollera att patienten tagit antiemetika                                          |              |               |
| 2     | Sätt spoldropp 500 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel |              | Cytodose      |
| 3     | Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml intravenöst                            | 1 timme      | Cytodose      |