

Maligt melanom Encorafenib (Braftovi)- Binimetinib (Mektovi)

Cytodose: ej aktuellt Kurintervall: kontinuerligt

Indikation: Maligt melanom. Metastaserat eller icke operabelt V600 BRAF-muterat maligt melanom

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, fast dos	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Encorafenib (Braftovi)	6x75 mg (450 mg)	1	kontinuerligt	po	Alla
B	Binimetinib (Mektovi)	3x 15 mg (45mg)	2	kontinuerligt	po	Alla

Prover inför start:

- Blodprover: BNL + neutrofila, CRP och p-glukos.
- EKG som baseline. EKG (QTc- förlängning över >500 ms är kontraindicerat EKG - kontakt kardiolog).
- UKG (LVEF) ska bedömas hos alla pt med känd hjärtsjukdom.
- Blodtryck.
- Kontroll av ögonbesvär, eventuell ögonundersökning.

Kontroller under behandling:

- Blodprover månadsvis till första utvärderingen och därefter utglesning: BNL + ASAT och CRP
- Blodtryck månadsvis till första utvärderingen och därefter utglesning.
- EKG som baseline och vid 6 månaders behandling och därefter 6 månaders intervaller. Vid känd hjärtsjukdom även efter 1 månad samt därefter 3 månaders intervall (QTc-förlängning över > 500ms är kontraindicerat – kontakt kardiolog)
- UKG ska göras på pt med hjärtsvikt vid symtom.
- Kontroll av hud- och ögonbesvär.

Villkor och kontroller för administration

- Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag
- Binimetinib tas morgon och kväll, Encorafenib tas vid ett tillfälle.
- Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 6 timmar (Binimetinib) respektive 12 timmar (Encorafenib) kvar till nästa planerade dos.
- *Encorafenib* - Samtidigt intag av grapefruktjuice ska undvikas.

Patientinformation

Patienten skall vara muntligt och skriftligt informerad. Patienten skall kontakta onkologkliniken vid nytillkomna symtom

Körschema: Encorafenib- Binimetinib

Att göra		Var ordinerat
<p>Läkare skriver recept. Ge tabletter för första veckan samt patientinformation</p> <p>Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan föda vid ungefär samma tidpunkt varje dag</p> <p><i>Encorafenib</i> - Samtidigt intag av grapefruktjuice ska undvikas</p>	<p>Inför start</p>	<p>Cosmic</p>

Övrig information

Behandling som EJ kan anstå 48 h driftavbrott i Cytodos, verksamhetskritiskt dokument som finns utskrivet i reservrutinspärm i Rödingen.

Patienten ska få tydlig information om biverkningar och vikten av att höra av sig för eventuell dosreduktion.

Dosreduktion rekommendation

- Dosreduktion vid biverkningar – [FASS- Encorafenib](#) + [FASS Binimetinib](#)–
- Rekommenderade dosjusteringar, se FASS.
- Första dossänkning Enkorafenib: till 300 mg en gång dagligen
- Andra dossänkning Enkorafenib: till 200 mg en gång dagligen
- Dossänkning Binimetinib: till 30 mg, 2 gånger dagligen.
- Om Binimetinib avbryts tillfälligt ska Enkorafenibdosen sänkas till 300 mg en gång dagligen då inget Binimetinib ges.