

GI CAPIRI 21 d

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: Metastaserande colorektalcancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle mg/m2	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Irinotekan	180	1	1	i.v.	1
B	Capecitabin	1000 (2000 mg/m2/dygn)	2	28	p.o.	1-14

Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Paus dag 15-21	Dag 22 ny kur
A Irinotekan	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B Capecitabin	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	

Övrigt

- Testa för DPYD-brist innan behandling ges
- Antiemetika, medelemetogen
- Förslag enligt stöddokument: [Steg 5a](#). OBS! Interaktion Irinotekan Apripetant steg 5b
- Irinotekan - premedicinering: ge subkutant Atropin 0,25 mg för att förebygga akut kolinergt syndrom. Om symtom uppstår, ge ytterligare subkutant Atropin 0,25 - 0,50 mg.
- Var särskilt observant vid diarréer och feber. Kan kräva inläggning.
- [Att förebygga och behandla hand-fotsyndromet](#)
- [Provtagning, rutinmässig](#). Kontroll av blodstatus, leverprover samt telefonkontakt av sjuksköterska med patienten dag 8 kur 1.

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid tox grad 0-I	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen
Grad III	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen	

Grad IV	Avsluta behandlingen
---------	----------------------

[Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling av capecitabin](#)

Dosreduktion hematologi

Neutrofila	TPK	Capecitabin	Irinotekan
≥ 1,5	≥100	100 %	100 %
	75-99	50-75 %	50-75 %
< 1,5	<75	Behandlingen uppskjutes 3-7 dagar. Överväg dosreduktion vid nästa kur.	

- [Patientinformation CAPIRI](#)
- [Medelemetogent](#)

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika		Cytodos
2	Ge subcutan injektion Atropin (ca 30 minuter före Irinotekan)		Cytodos
3	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		-
4	Ge Irinotekan spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodos
5	Skriv ut medicinlista från ELAS		Cytodos
6	Lämna tabletter och medicinlistan till patienten		

Anmärkningar

- Uppföljning med avseende på hand-fot syndrom och övrigt enligt NCIC-gradering vid varje besök