

Cytodos, lathund bygga ny regim, manual

1. Logga in som Regimadministratör



2. Klicka NyReg

Fliken Generellt

3. <u>Regim</u>; Ange regimnamn (Obs! Namnet går EJ att ändra efter att man godkänt en gång – spara därför "Under arbete" vid osäkerhet runt namnsättning)

4. Max kroppsyta; ange 2,5 - undantag gynregimer som har max kroppsyta 2,0

5. Regim AUC; endast vid karboplatinbehandling

6. <u>Ant. dagar till nästa kur</u>; Ange rätt antal dagar till nästa kur (genererar ett popup fönster med varningsmeddelande om man ordinerar tätare än cykelintervallet)

7. Läkarinformation;

Hänvisning till kurbeskrivning på intranätet via länken i den lilla jordgloben.

Aktuellt antiemetikaschema d.v.s. låg-, medel- och högemetogent eller annat.

Observens för: d.v.s. vanliga biverkningar som kan leda till dosreduktion eller inställd behandling.

Kopiera infotexten från andra regimer för att få t.ex. substans infon så lika som möjligt, t.ex. särskild info om bevazicumab, atropin vid irinotekan, kortison vid Docetaxel osv

8. Sjuksköterskeinformation:

Kortfattad info om t.ex. akutvagn tillgänglig osv

9. Extern

läkardokumentation/sjuksköterskedokumentation/farmaceutdokumentation; här kan man lägga länkar till ex. kurbeskrivningen på intranätet.

- Kopiera aktuell webbadress Ctrl+C
- Klicka på Extern läkar/sjuksköterske/faramaceutdokumentation

– Klistra in adressen i Länkrutan och klicka Test för att se om man länkas rätt.

Caroline Wiklund Caroline Wiklund



Regim	Kur ID Version 0.1	Nat. std.	Upprättat Elisabet Norén	av läkare Dat 2017-06-	tum 13		
Intern id	Status						
2351	Status : Under arbete		Ny version	🧉 Som mall	Exportera		
Generellt Doseringsregler	Dosering 🐼 Avru	idningaregler	🛆 Kriiska parametrar	Observationer	📔 Diagnos/protokoll/indikati	on 🚯 Regiminformation	Färdigställ regin
Regimdetaljer							
Max kroppsyta : Max ålder i	år ICD Z-kod :	Regim AUC	Ant. dagar till nästa ku	r.	Rekvisitioner base	erade på denna regim :	_
	(Inte givet)	0,0	0	Detta är en studier	egim 🔃 mäste dubbels	igneras 💟 kan användas	som mall
Sjuksköteskeinformation :						Extern sjuksköterskedok	umentation *
Farmaceutinformation :		Extern farm	aceutdokumentation [*]	Patientinformation :		Extern patient	tinformation

Exempel från befintlig regim:

Regim I Bevacizumab-Capecitabin 21 d	Kur ID Version	Nat. std.	Upprättat av Elisabet Norén	läkare Datu 2015-12-03	im 3		
Intern id	Status						
5085	Status : Godkänd		📫 Ny version	🔆 Som mall	Exportera		
Generellt	Dosering 🐼 Avru	undningsregler 🛛 🛆 K	ritiska parametrar	Observationer	Diagnos/protokoll/indikat	tion 🚯 Regiminformation	Färdigställ regim
Regimdetaljer Max kroppsyta : Max ålder	i år ICD Z-kod :	Regim AUC Ant. da	ıgar till nästa kur:		Rekvisitioner bas	serade på denna regim :	
2,50	(Inte givet)	0,0 20		Detta är en studiere	gim 🔄 mäste dubbels	signeras 💟 kan användas	som mall
Läkarinformation :						Extern läkardok	umentation
- siemninnetox, piarre, Hand+ot - Buksmärta, proteinuri, blodtryck Dygnsdosen Capecitabin ges fördelad I Capecitabin kur 1 skall blodstatus oc Siuksköteskeinformation :	på morgon och kvällsdos och h leverstatus kontrolleras eft	ges dag 1 - 14 . Därefter er en veckas behandling o	följer 7 behandlingsfr ch telefonkontakt tas	ia dagar. innan klartecken att inled	a beh-vecka 2 ges.	Extern siuksköterskedok	umentation
Akutbricka Kontroll av blodtryck och proteinuri fö OBSI Risk för GI-perforation - skärpt I Capecitabin kur 1 skall blodstatus oc	re bevacizumabbehandling ob vaksamhet vid buksmärtor h leverstatus kontrolleras eft	oligatoriskt er en veckas behandling o	ch telefonkontakt tas	innan klartecken att inled	a beh-vecka 2 ges.		
Farmaceutinformation :		Extern farmaceutdo	okumentation ¹ Pa	tientinformation :		Extern patienti	information
			Sv eft Ta	älj capecitabintablett ter avslutad måltid. 1 morgon och kvällsdo	erna hela tillsammans m osen med ca 12 timmars	ned måltid eller med vatten ino s intervall.	om 30 min

Fliken Doseringsregler

10.* Kan användas om något läkemedel har en bestämd dos baserat på någon av följande parametarar: ålder, kroppsyta, vikt eller kön.

Exempel där doseringsregler används är Metotrexate till barn (vikt) eller Capecitabin (kroppsyta).

(Hur man gör, se längre ned i lathunden)

Fliken Dosering

11. Lägg till dygn; Högerklicka i det vänstra fältet + lägg till Ny rad. Obs! Viktigt att klicka ur den blå lilla bocken.

12. Blåmarkera dygnet för att lägga in den dagens alla substanser - hö klicka i högra fältet + lägg till NY rad.

Caroline Wiklund Caroline Wiklund Gäller från Version Dokument ID



13. Lägg till alla läkemedel som ska ingå i regimen. Lägg in rätt info i alla kolumner! (<u>Max dos</u> används sällan och kolumn <u>Uträkning</u> efter infusionsvätska är alltid standard.)

14. Kolumn <u>Utförare</u>: Vid valet "Extern" skapas en medicinlista, men tänk på att denna rad ej syns eller är signeringsbar i Cytodose web. Överväg därför om man ska lägga till den gula substansen "Läkemedel för administrering hemma" och "Kontroll" d.v.s. dubbelsignering.

15. Ange adm. tidpunkt(er)

Intern id		Status						
72374	Status : Under arb	oete	Ny version	🔆 Som mall	Exportera			
				1				
Generellt 🕞 Doseringsregler	Dosering	Real Avrundningsregler	🛆 Kritiska parametrar	Observationer	🛐 Diagnos/protokoll/indikation	Regiminformation	Färdigställ regim	
Kurdag : 1								
Duran Charth Balan M	- Ded	Culture	Consider No. Mar	ada a falada 1065	Index Toforday and the Toronto	Courseling to an New York	ing adaption as	1
Dygn Start Bekr. N	Rad	Substans	Grunddos Ma	k dos Enhet Utra	ikning Infusionsvätska (ml.)	Grundvolym Utraki	ning Adm.satt A	Im.c
	•							- Þ.
	Tillester							
	- msatse	Kommentarer	Ubservation	er				
	Tillsatser	۰.	Grunddos T	nhet Uträkning				
	- moutout							

Exempel:

Caroline Wiklund Caroline Wiklund Gäller från Version Dokument ID



F GI Panitumumab- In 57064	Regim FLIRI 14 d tern id	Kur ID Ve	ersion Nat. std. 0.6 🔲 Status		Upprättat Elisabet Norén	av läkare	2 Som	016- ı mall	Datum 02-05		Exportera								
Generellt	Doseringsregler	Ø Dosering	_{Avrundningsregler}	£к	iritiska parametrar	- O	oserva	tione	r 🚺	Diagn	os/protokoll/indikation		🚯 Regimin	form	ation	F	ärdigställ regim		
Kurdag :	1		Aktiv substans : Panitumumab inf.			Kopi (inge	erat : nting)						-						_
Dygn Start	Bekr. Na	Rad	Substans	(Grunddos 🎈	Max dos	Enhe	t	Uträknin	g	Infusionsvätska (n	1I)	Grundvolyn	•	Uträknir	ıg	Adm.sätt	P	\dm.c
1		1 🛷 📼	. Panitumumab inf.		6,00 💌		mg	•	Vikt	•	Natriumklorid 9 mg/ml		250	-	Standard		Intravenöst	•	1 ti
2		2 🖧 💌	4 Atropin injektion	-	0 💌		mg	v	Standard	-	Inget	•	0	•	Standard	-	Subcutant	•	0 ti
		3 🖧 💌	Betametason tablett	-	8,00 💌		mg	•	Standard	•	Inget	•	0	-	Standard	-	Peroralt	-	
		4 🛷 📼	Ondansetron tablett		16,00 💌		mg		Standard	-	Inget		0	-	Standard	-	Peroralt	-	
		5 🛷 📼	Irinotekan inf.	-	180,00 👻		mg		Kroppsyta	-	Natriumklorid 9 mg/ml	9	500	-	Standard	-	Intravenöst	-	1 ti
			Fluorouraci inf.		500,00		mg		Kroppsyta		Natriumklorid 9 mg/ml	-	100		Standard		Intravenost	-	0 t
		4				111													•
		🥟 Tillsatser	(i) Kommentarer (2)	0	Villkor 📀 Obs	ervationer													
		Komment	ar Don första inforier		- den de la composition de la		1										1		
			Minista infusionen ges i	utan öv Danit	verkänslighetsreak	uoner, gés fo Dimin	ojande	Infu	sioner und	er 30	min.								
		4 🙂 🗖	via dos over 1000 mg, ges	s raniti	munabin under 9	viniti.													

16. Skapa kommentar till en substans: blåmarkera raden.

17. Välj Flik Kommentarer i nedre fältet.

18. Högerklicka i kommentarfältet och skriv eller klistra in kommentar.

(Begränsat antal tecken)

(Fliken <u>Villkor</u> används endast av barnkliniken runt metotrexatkoncentration. Om man skapar en ja/nej fråga i denna flik genererar den en tvingande fråga i ELAS innan ssk signerar läkemedlet.)

Fliken Övriga regler

19. Används om avrundningsregel behöver göras

Flikarna Kritiska parametrar och Observationer används ej

Fliken Diagnos/protokoll/indikation

20. Högerklicka en eller flera gånger i diagnosfältet för att lägga till diagnos(er) som regimen ska vara sökbar på. Välj bland diagnoskoderna i radens meny.

21. Fliken <u>Regiminformation</u> används ej av Jönköping.

Linköping och Kalmar skriver sina kurbeskrivningar här.

Fliken Färdigställ regim

22. Spara regimen genom att välja <u>Kontrollera regim</u> = regimen klar för läkargranskning eller <u>Under arbete</u> =fortsatt arbete/redigering behövs före läkargranskning.

Godkänt av Innehållsansvarig Kapitel Caroline Wiklund Caroline Wiklund Gäller från Version Dokument ID



23. <u>Makulera</u>, tar bort allt som är gjort denna version. Om det är version 0.1 försvinner regimen helt!

72518	Intern id	Status : Linder ar	Status	III Q Marcaneleo	12/2 Com mall	20 Experience			
12510		platas : onder a	bette	U.2 My Version		Cal Exportera			
Generel	Doseringsregler	Dosering	Rvrundningsregler	🗥 Kritiska parametrar	Observationer	Diagnos/protoko	Il/indikation	Regiminformation	Färdigställ regim
Kontrol	Kontrollera regin Under ar		🖋 Godkänn regim	X Makulera	🖹 Skriv ut	Skrivare : \\SAFE	COMP02\PullPrint_	Dubbelsidig	
	Landstin Länssjuk Telefon :	jet i Jönköpings län huset, Ryhov, 551 (036-321000	85 Jönköping						
	Regim			Status : Ur	der arbete	^{IR.} F2			

*Flik Doseringsregler

24. Högerklicka i översta fältet – lägg till ny rad. Viktigt att namnge regeln noggrant, stäm av med Anne om namngivning! (se exempel nedan från Capecitabin, regelnamnet visas i doseringsrutans tool-tip vid ny rekvisition.)

25. Ange parameter

26. Högerklicka + lägg till rad i det nedre vänstra fältet.

27. Detta är trixigt men börja med att ange värde i FÖRSTA rutan på ANDRA raden. I exemplet nedan är det rutan "1,27".

28. Fortsätt att lägga till rader i det nedre vänstra fältet beroende på hur många doseringar som finns. Dosgränsen anges alltid i första rutan på raden.



Caroline Wiklund Caroline Wiklund Gäller från Version Dokument ID