

Maligt melanom Nivolumab s.c. 600 mg 14 d

Cytodose: "Maligt Melanom Nivolumab s.c. 600 mg 14 d" Kurlängd 14 dagar

Indikation

Maligt melanom. Första linjens behandling. Adjuvant ges behandling under 1 år d.v.s. 12 kurer.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/kur	Adm	Dag
A	Nivolumab	600 mg (fast dos)	1	1	s.c.	1

	Substans/dag	1	Paus dag 2-14	Dag 15 ny kur
A	Nivolumab	A	-	

Behandlingen pågår tills patienten progredierar eller får biverkningar som kräver utsättning

Övrigt

- [Biverkningshantering via RCC & Stöd vid immunterapi intranätet](#)
- [Kontaktuppgifter till konsult](#)
- Vid byte från 600 mg varannan vecka till 1200 mg var fjärde vecka ska den första dosen på 1200 mg ges två veckor efter den sista dosen på 600 mg
- Vid byte från 1200 mg var fjärde vecka till 600 mg varannan vecka ska den första dosen på 600 mg ges fyra veckor efter sista dosen på 1200 mg
- Vid infusionsreaktion som t.ex. feber, frossa eller värk bör Paracetamol 1000 mg och Desloratadin 5 mg ges. Detta kan också övervägas att ges som premedicinering inför behandlingar därefter.
- Patient med TB eller Hepatit-anamnes, kontakta infektion
- [Provtagning immunoterapi singel](#)
- *Dosreduceras ej. Uppehåll eller behandlingsavslut vid toxicitet.*
- Antikonception

Biverkningar

Grad I	Symtomatisk behandling
Grad II	Uppehåll med behandling. Steroid behandling motsvarande Prednisolon 1-2 mg/kg per dag. Reduceras när biverkningar är grad I, minst 4 veckors steroidbehandling
Grad III- IV	behandlingen utsättes permanent. Metylprednisolon i.v. 125 mg dag 1, därefter Prednisolon 1-2 mg/kg per dag p.o. Om ej svar på prednisolon ge Infliximab (Remicade) 5 mg/kg x 1

Biverkningar ska rapporteras som Events of Clinical Interest och SAE

[Patientinformation](#)

Körschema

Att göra	Administreringstid	Var ordinerat
Akutvagn tillgänglig		-
Låt 1 injektionsflaska med Nivolumab 600 mg uppnå rumstemperatur och dra därefter upp 5 ml injektionsvätska i sprutan		
Ge subkutan Nivolumab i magen eller låret, med fördel via butterflykanyl. Hela dosen ges på samma ställe. Byt injektionsställe vid efterföljande injektioner. Injicera inte i områden där huden är öm, röd, har blåmärken, ärr eller leverfläckar.	3-5 minuter	Cytodos
Patienten ska stanna kvar 15 minuter efter behandlingen för observation		

Anmärkningar

Telefonkontakt med patienten till sjuksköterska 1 vecka efter första behandlingen, därefter individuell bedömning. Kontroll av immunorelaterade biverkningar.