Ultraljud finnålspunktion, instruktion till remittent, röntgen Region Jönköpings län

Kontraindikationer

Om blödningsparametrar avviker från gränsvärden ska åtgärder vidtas.

Förberedelser

Ytliga lokalisationer (hals, mjukdelar)

- Polikliniska patienter.
- Provtagning enligt särskild rutin
- Blodförtunnande läkemedel ska vara utsatt enligt rutin.
- PAD-remiss *”allmän”* ska finnas i ROS. Observera att önskad lokalisation för biopsin ska stämma med vad som angivits på röntgenremissen.

Djupa lokalisationer (buk, thorax etc.)

- Patienten ska vara inneliggande, komma i renbäddad säng och vara klädd i patientkläder.
- Läkare/sjuksköterska på vårdavdelningen bedömer om smärtstillande och lugnande läkemedel behövs innan biopsi. Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta måste patienten ha någon form av premedicinering.
- Patienten ska ha en fungerande PVK.
- 6 timmars fasta för fast föda, samt 2 timmars fasta för genomskinliga vätskor (vatten, saft utan fruktkött, kaffe/te (med lite mjölk)) före ingreppet.
- Provtagning enligt rutin.
- Blodförtunnande läkemedel ska vara utsatta enligt rutin. Se separata dokument.
    - Blödningsförebyggande rutin inför dränage, biopsi och punktion.
    - Blödningsförebyggande rutin inför invasiva röntgenundersökningar (Eksjö).
- PAD-remiss *”allmän”* ska finnas i ROS. Observera att önskad lokalisation för biopsin ska stämma med vad som angivits på röntgenremissen. Remissen ska endast vara skapad. Skriv inte ut etiketter, då blir remissen låst och kan inte användas. Etiketter skrivs ut på röntgen i samband med undersökningen.

Hur går en undersökning till

- Patienten ska kunna ligga stilla under undersökningen som tar cirka 30 minuter.
- Patienten ska kunna medverka till och följa instruktioner.

- Lokalbedövning ges.
- Provtagning sker med finnål.

Remiss

- Ange eventuellt tolkbehov, se dokument ”Tolkbehov inför röntgenundersökning”.
- Ange eventuell allergi mot lokalbedövningsmedel
- Ange om patienten står på blodförtunnande läkemedel och om de är utsatta eller inte.

Eftervård

Ytliga lokalisationer

- Patienten sitter kvar på röntgen 30 minuter efter avslutad undersökning.
- Kontroll av blodtryck och punktionsställe innan patienten går hem.

Djupa lokalisationer

Patienten ska kontrolleras och observeras sängliggande på vårdavdelning enligt eftervårdsblankett.

Kontakt

Röntgens kundtjänst, tfn 010-241 04 00.