

REKOMMENDATION - AVSTÅ

Regional samverkansgrupp läkemedel
Sydöstra Sjukvårdsregionen

2026-01-13

Nilemdo (bempedinsyra)

Regional samverkansgrupp läkemedel rekommenderar att avstå med användning av Nilemdo vid hyperkolesterolemi, blandad dyslipidemi och kardiovaskulär sjukdom.

TLV avslog i december 2025 företags ansökan om subvention. TLV bedömde att kostnaderna för Nilemdo vid behandling av statintoleranta patienter bedöms inte vara rimliga i förhållande till den nytta som behandlingen ger. TLV:s analyser visar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår överstiger den nivå TLV vanligtvis bedömer som rimlig vid tillstånd med medelhög svårighetsgrad. Med hänsyn tagen till de sidoöverenskommelser som finns för Repatha och Praluent konstaterar TLV att Praluent har lägst läkemedelskostnad och därmed är det mest kostnadseffektiva av de kliniskt relevanta behandlingsalternativen.

Förmånsbeslutet finns att läsa i sin helhet på [TLV:s hemsida](#).

Bakgrund

Nilemdo innehåller den aktiva substansen bempedinsyra som är en hämmare av enzymet ACL. Hämmning ger nedsatt kolesterolsyntes i levern och sänker LDL-kolesterolnivåerna i blodet genom att uppreglera LDL-kolesterolreceptorer. Dessutom leder hämmning av ACL till samtidig dämpning av biosyntesen av fettsyror i levern.

Rekommendationen kan komma att uppdateras.