

دواء مهدئ بالتلازم مع علاج أسنان الشباب

Lugnande medicin i samband med tandbehandling av ungdomar

في بعض الحالات، يعطي طبيب الأسنان دواء مهدئ قبل علاج الأسنان. هذا حتى لا تشعر بالخوف أو القلق أثناء العلاج. يساعد الدواء المهدئ أيضاً في جعلك تنسى إذا كان العلاج مزعجاً. يتم إعطاء الدواء المهدئ في شكل أقراص أو مستحضر (سائل).

أمور من المهم التفكير بها قبل العلاج واستخدام الدواء المهدئ

- لا يجوز أن تتناول الطعام الصلب، الحساء، اللبن السائل واللبن الرائب أو ما شابه ذلك أو أن تشرب الحليب لمدة أربع ساعات كاملة قبل تطبيق العلاج.
- يجوز شرب المياه العادية أو الشراب - أي المشروبات الصافية - ويجب التوقف عن ذلك لمدة ساعة قبل العلاج. لا تشرب العصائر.
- لا يجوز أن تشرب أية سوائل لمدة ساعة كاملة قبل علاج الأسنان.
- من المهم للغاية أن يكون بصحبتك شخص أثناء ذهابك إلى العيادة والعودة منها.

هكذا يعمل الدواء المهدئ

- له تأثير يبعث على الاسترخاء والهدوء.
- له تأثير مرخ للجهاز العضلي ويؤثر في التوازن.
- يمكنه أن يؤثر على القدرة على التذكر.

فكر بما يلي بعد العلاج

بعد انتهاء علاج الأسنان، يتعين عليك البقاء في العيادة لمدة ساعة واحدة على الأقل من تناولك المهدئ. من المهم للغاية أن يكون بصحبتك شخص أثناء ذهابك إلى العيادة والعودة منها. يتعين عليك عدم قيادة سيارة أو دراجة نارية، حتى انقضاء أربع وعشرين ساعة.

Lugnande medicin i samband med tandbehandling av ungdomar

Ibland ger tandläkaren en lugnande medicin före tandbehandlingen. Det är för att du inte ska känna ängslan eller oro vid tandbehandlingen. Medicinen hjälper dig också att glömma om behandlingen har varit obehaglig. Medicinen ges i form av tabletter eller mixtur (flytande).

Viktigt att tänka på inför behandling med lugnande medicin

- Du ska inte äta fast mat, soppa, fil, yoghurt eller liknande eller dricka mjölk senare än fyra timmar före tandbehandlingen.
- Det går bra att dricka vatten eller saft, det vill säga klar dryck, fram till en timme innan tandbehandlingen. Drink inte juice.
- Senare än en timme före tandbehandlingen får du inte dricka någonting alls.
- Det är mycket viktigt att någon följer dig till och från kliniken.

Så fungerar den lugnande medicinen

- Den har en avslappnande och lugnande effekt.
- Den verkar avslappnande på muskulaturen och påverkar balansen.
- Den kan påverka förmågan att komma ihåg.

Tänk på detta efter behandlingen

Efter avslutad tandbehandling får du stanna kvar på kliniken minst en timme från det att du tog medicinen. Det är mycket viktigt att någon följer dig till och från kliniken. Du får inte köra moped eller bil förrän efter 24 timmar.