

Cefuroxim (Zinacef) 50 mg/mL, vid ögonevisceration, Ögonkliniken Jönköping och Värnamo

Vid beredning av antibiotika används spike avsedd för antibiotika.

Komposition

Cefuroxim 250 mg pulver	250 mg
Natriumklorid 9 mg/mL	5 mL

Beredning

1. Dra upp 5 mL Natriumklorid 9 mg/mL.
2. Tillsätt till flaskan med Cefuroxim 250 mg pulver.
3. Blanda. **Koncentrationen cefuroxim i beredningen blir 50 mg/mL.**
4. Märk upp sprutorna med läkemedel, koncentration, datum, klockslag och signatur.

Dosering

Standarddosering: 1 mL= 50 mg, 0,5 mL= 25 mg

Används vid ögonevisceration när infektionsmisstanke finns.

Observera

Pulvret i sig bidrar med viss volym vilket gör att slutvolymen inte kommer att bli exakt.

Hållbarhet och förvaring

Bör användas direkt efter spädning av mikrobiologiska skäl.

Beredd lösning kan sparas i 12 timmar i rumstemperatur (eller 24 timmar i kylskåp) av kemiskt stabila skäl.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT