

## Åtgärdschecklista vid covid-19 i ordinärt boende

*Till dig som chef*

Förutom checklistan rekommenderas genomgång av:

- [Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid 19 i ordinärt boende](#)
- [Utökad provtagning \(screening\) för covid-19 vid utskrivning från sjukhusvård, vid in- och överflyttning inom kommunal vård och omsorg](#)
- [Smittspårning vid nyupptäckt fall hos vårdtagare i ordinärt boende](#)

### Vid misstänkt fall med symtom på covid-19 i ordinärt boende

Tillämpa skärpta hygienrutiner.	
Säkerställ tillgång till och användning av adekvat skyddsutrustning samt att avklädning av skyddsutrustning sker på ett säkert sätt.	
Medicinsk bedömning och ställningstagande till provtagning.	
Avdela <i>om möjligt</i> särskild omvårdnadspersonal för vård- och omsorg till vårdtagare med symtom dag och natt.	
<b>Vid negativt provsvar hos vårdtagare med symtom på covid-19</b>	
Vårdtagare ges omsorg utifrån en medicinsk bedömning. Tillämpa adekvata vårdhygieniska åtgärder utifrån symtombilden.	

### Vid konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende

Tillämpa skärpta hygienrutiner.	
Säkerställ tillgång till och användning av adekvat skyddsutrustning samt att avklädning av skyddsutrustning sker på ett säkert sätt.	
Avdela <i>om möjligt</i> särskild omvårdnadspersonal för vård- och omsorg till vårdtagare med symtom dag och natt.	
Se till att vårdtagare informeras om och får möjlighet eller hjälp att tvätta händerna ofta och noggrant.	
Uppmuntra till extra vaksamhet på symtom hos exponerade medboende.	
Vårdtagare med covid-19 smittfriförklaras med stöd av <a href="#">Vägledning för smittfriförklaring</a>	
<b>Smittspårning vid nyupptäckt fall hos vårdtagare med covid-19</b>	
Kartlägg och upprätta <a href="#">kontaktlista för smittspårning</a> på all personal som har varit i kontakt med smittad vårdtagare. Detta oberoende om	

skyddsutrustning används eller inte. Andra personer som vårdtagaren varit i kontakt med ansvarar vården för eller vårdtagaren själv för att kartlägga och informera.	
Informera personal om att de kan ha blivit utsatt för smitta och att de ska vara observanta på symtom under 14 dagar från sista möjliga smittotillfället. Sekretess råder kring vilken person som insjuknat. Överlämna <a href="#">Informationsblad till personal</a>	
Överlämna kontaktlista för smittspårning till den vårdcentral som vårdtagare är listad hos för ordination. Efterhör när provtagningsunderlag (ordination) finns tillgängligt.	
Hänvisa personal till sin vårdcentral för provtagning mån-fredag. Överlämna skriftlig <a href="#">Information till personal som provtas för covid-19 i samband med smittspårning i kommunal vård och omsorg</a>	
Sammanställ en <a href="#">slutrapport</a> efter smittspårning. Görs då kartläggning är gjord, kontakterna listade och informerade samt provtagning av kontakter är utförd och svar finns. Skicka en kopia av sammanställningen till Medicinskt ansvarig sjuksköterska och till Smittskydd Vårdhygien	

### Vid utskrivning från ineliggande sjukhusvård till ordinärt boende

Säkerställ <i>om möjligt</i> om det finns information om det funnits fall av covid-19 på den enhet som vårdtagaren flyttar ifrån och om vårdtagaren kan vara exponerad och i så fall på vilket sätt. Exempelvis bor eller har bott tillsammans med person som har covid-19.	
Provtagning (screening) för covid-19 utförs på vårdtagaren <i>helst</i> så att svar föreligger vid hemgång. Undantag från provtagning är de som har eller haft en bekräftad covid-19 infektion inom 6 mån. Prov ska inte vara äldre än 2 dygn vid utskrivning från sjukhus	
Vårdtagare utan symtom som <i>inte utsatts för en konstaterad smitta</i> ges vård och omsorg enligt vanliga hygienrutiner. Det vill säga utan särskild skyddsutrustning. Vårdtagaren ses som inte smittsam.	
Vårdtagare <i>som utsatts för smitta</i> ska observeras och bedömas med fokus på infektionssymtom vid insats under 14 dagar från senast möjliga kontakt med smittsam person. <a href="#">Använd checklista för symtomkontroll vårdtagare</a>	
Vårdtagare bedömd som <i>närkontakt</i> ses inte som smittsam, men löper risk att insjukna. Ges vård och omsorg enligt vanliga hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.	
Vårdtagare bedömd som <i>hushållskontakt</i> löper stor risk att insjukna med symtom och ses som ett misstänkt fall det vill säga smittsam i 7 dagar efter att det bekräftade fallet provtogs. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ge vård och omsorg med fokus på <i>skärpta hygienrutiner</i> med särskild skyddsutrustning (munskydd och visir) under de första 7 dagarna.</li> <li>• Därefter tillämpas vanliga hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.</li> </ul>	
Vid negativt provsvar upprepas provtagning <i>endast</i> om symtom uppstår under inkubationstiden på 14 dagar. Provtagningen utförs då av den	

verksamhet som har hälso- och sjukvårdsansvar för vårdtagaren.	
Positivt provsvar hanteras enligt <a href="#">Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid 19 i ordinärt boende</a>	