

Obidoxim (Toxogonin), ANTIDOT Region Jönköpings Län

ANTIDOT - OBS! Ges i samråd med Giftinformationscentralen (GIC).

För behandling av förgiftningar med organiska fosforföreningar och nervgaser

Komposition för injektion (infusion)

Toxogonin 0,25 g/mL = 250 mg/mL	Ordinerad mängd
Natriumklorid 9 mg/mL	X mL

Beredning

1. Dra upp ordinerad mängd Toxogonin i lämplig spruta.
2. För att underlätta för långsam intravenös administrering kan Toxogonin spädas med 5-10 mL Natriumklorid 9 mg/mL.

Dosering

Dosering i samråd med GIC.

Vuxen

Standarddos: 250 mg intravenöst under 5-10 min.

Dosen kan upprepas var 8:e h eller ges som kontinuerlig infusion (750 mg/dygn = 31,25 mg/h). Avvakta infusionsbehandling tills antalet exponerade patienter samt tillgång till antidot har fastställts. Ring Giftinformationscentralen

Barn

Standarddos: 4 mg/kg intravenöst under 5-10 min.

Dosen kan upprepas var 8:e h eller ges som kontinuerlig infusion (750 mg/dygn = 31,25 mg/h). Avvakta infusionsbehandling tills antalet exponerade patienter samt tillgång till antidot har fastställts. Ring Giftinformationscentralen

Observera

Kan även ges intramuskulärt
Ska endast ges efter atropindos.
Licensläkemedel

Hållbarhet och förvaring

Hållbarhet efter beredning: används omedelbart
För lagerhållning, se SVEPA.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT