

## Riktlinjer vid bettavvikelser

**\*Underlag för konsultation omfattar anamnes, status, foto och dokumentation av anlag med erforderlig röntgen, om inget annat anges. 13 och 43 markeras med en prick på buckalytan innan foton tas.**

<i>Bettutvecklingsstadium</i>	<i>Viktigt att uppmärksamma</i>	<i>Kommentar</i>	<i>Rekommenderad handläggning</i>
<u><i>Primära bettet</i></u> <i>Ca 3–6 år</i>	Korsbett	Kontrollera sugvana. Rekommendera minskad sugtid/avsluta ovana.	Konsultation * när permanenta 6:or i överkäken är helt erupterade.
	Öppna bett	Kontrollera sugvana. Rekommendera minskad sugtid/avsluta ovana.	
<u><i>Tidigt växelbett</i></u> <i>Ca 6–7 år</i> <i>6:or och 1:or nyligen erupterade</i>	Inverterade 1:or i ök	Observera eventuell tvångsföring.	Konsultation * Ta även foto i RP.
	Inverterade 2:or i ök		Avvakta permanenta tänders eruption.
	Eruptionsstörning i fronten		Konsultation *
	Ektopisk eruption 6:or	Vid problem med hygien eller infektion – överväg att extrahera 05:an.	Avvakta
	Saxbitning 6:or Frontalt öppna bett	Avsluta eventuell sugvana.	Konsultation *
<i>Ca 7–8 år</i> <i>2:or inför/under eruption</i> <i>6:or helt erupterade</i>	Platsbrist för 2:or	Platsbrist är av sådan omfattning att serieextraktion kan övervägas.	Konsultation *
	Unilateralt exfolierade 03:or Tvångsförande korsbett	Extraktion av motstående sidas 03:a. Observera eventuell tvångsföring.	Konsultation * Ta foto även i RP
<i>Ca 9-10 år</i> <i>2:a-2:a helt erupterade</i>	Stora horisontella överbett	Avvakta permanenta tänders eruption. Mät horisontell överbitning i RP. Notera läppslut.	Konsultation * när permanenta tänder erupterat.
	Aplasi 2:or ök		Konsultation *
	Aplasi premolarer		Konsultation *
	Ektopiskt läge 3:or	Röntgenkontroll, lägesbestämning, ev. extr 03:or; se separat dokument.	

## Riktlinjer vid bettavvikelser

<i>Bettutvecklingsstadium</i>	<i>Viktigt att uppmärksamma</i>	<i>Kommentar</i>	<i>Rekommenderad handläggning</i>
<u><i>Sent växelbett</i></u> <i>Ca 10–12 år</i> <i>Premolarer under</i> <i>växling</i>	Ektopiskt läge premolarer		Konsultation *
	Platsbrist sidopartier	Platsbrist är av sådan omfattning att extraktioner kan övervägas.	Konsultation * inklusive modell
	Saxbitning premolarer		Konsultation *
	Primära tänder som ej exfolierar	Extrahera den primära tanden om positionen på efterföljande tand påverkas.	
	Stor horisontell överbitning med ansträngt läppslut	Avvakta permanenta tänder eruption.	Konsultation * när permanenta tänder erupterat
<u><i>Tidigt permanent bett</i></u> <i>Ca 12–14 år</i> <i>7:or och premolarer</i> <i>nyligen erupterade</i>	Retinerade 3:or	Röntgen för lägesbestämning om ej palperbara.	Konsultation *
	Enstaka icke funktionsstörande korsbitning	Accepteras.	
	Ektopisk eruption 7:or i uk		Konsultation *
	Saxbitning 7:or		Konsultation *
	Övriga tandställningsfel och bettavvikelser med subjektivt <u>och</u> objektivt behandlingsbehov enligt kriterier ***.	Notera riskgrupp i R2 **	Konsultation *

**\*\*Remiss till ortodontiavdelningen för fast apparatur förutsätter R2 grön. Om risk finns för skador på intilliggande permanenta tänder skickas remiss oavsett riskgrupp. Riskgruppering ska då anges i remissen.**

**\*\*\*Finns på intranätet: Folkhälsa och sjukvård/ Vårdstöd/ Tandvård/ Specialisttandvård/ Kriterier för avgiftsfri ortodontibehandling inom Region Jönköpings län.**