

Glykopyrronium (Robinul)-Neostigmin för neuromuskulär reversering, OP Eksjö

Används när fabriksblandad RobinulNeostigmin 0,5 mg/mL+2,5 mg/mL är restnoterad

Komposition för injektion

Glykopyrronium 0,2 mg/mL, injektionsvätska	2,5 mL
Neostigmin 2,5 mg/mL, injektionsvätska	1 mL

Beredning

1. Drag upp 2,5 mL Glykopyrronium i en 5 mL spruta.
2. Dra därefter upp Neostigmin 1 mL i samma spruta
3. Blandningen med 3,5 mL innehåller 0,5 mg Glykopyrronium samt 2,5 mg Neostigmin vilket motsvarar en dos.

Dosering

Dosering avser vuxna

Doseras enligt generella direktiv på operationsenheten

Observera

Barn doseras enligt Neostigmin. Robinul innehåller per mL endast 40 % så mycket Glykopyrronium som Robinul-Neostigmin så där behövs alltså 2,5 gånger så mycket i mL. Rådgör alltid med ansvarig narkosläkare.

Alternativet är att använda Neostigmin och Atropin.

Används då alla glykopyrroniumbromid-produkter är restnoterade.

Vuxna: Till 2,5 mg Neostigmin används 1 mg Atropin (OK i samma spruta).

Barn: Neostigmindoseringen är 0,05 mikrog/kg. Atropin blir 0,04 mg/kg.

Rådgör alltid med ansvarig narkosläkare.

Hållbarhet och förvaring

Används omedelbart efter beredning.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT