

Lixiana

(innehåller edoxaban tosilate)

Vad är Lixiana?

Lixiana används för att förhindra blodproppar i hjärnan (stroke) vid förmaksflimmer.

Läkemedlet verkar genom att blockera ett ämne i blodet som medverkar i bildningen av blodproppar.

Hur tar man Lixiana?

Man kan svälja tabletten med lite vatten.

Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Då får du bästa möjliga resultat av behandlingen.

Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tidpunkter varje dag. Välj tillfällen som passar ihop med dina dagliga rutiner, så är det lättare att komma ihåg medicinen.

Om du glömt att ta din medicin bör du ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra, ta aldrig dubbel dos. Avbryt aldrig på egen hand behandlingen med Lixiana. En läkemedelsbehandling ska alltid avslutas i samråd med förskrivare.

Det är viktigt att alltid berätta för läkare och tandläkare man har kontakt med att man tar Lixiana. Eftersom medicinen påverkar blödningstiden kan man behöva göra uppehåll i sin medicinering inför planerade operationer.

Vid behandling med Lixiana ska en ”Lixiana-bricka” bäras runt halsen eller i plånboken. Detta som säkerhet om du skulle råka ut för något som gör att du inte själv kan berätta att du tar medicin som påverkar blodets levringsförmåga.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du tar. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Provtagning

För att veta att du får rätt dos kommer du behöva ta prover på din njurfunktion regelbundet (efter 3 månader, 6 månader, samt efter 12 månaders behandling). Kallelse till detta kommer från AK-mottagningen på sjukhuset.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. De allra flesta får inga biverkningar men en del som använder Lixiana kan få illamående, utslag eller blodbrist.

Eftersom läkemedlet påverkar blodets förmåga att levera sig har man en ökad risk för blödningar, till exempel blåmärken och svullnader, blod i urinen, näsblod eller från mage/tarm. Vid blödning som inte spontant slutar eller om du känner dig ovanligt svag, trött, blek, yr och får ont i huvudet, ökad andfåddhet, bröstsmärta eller kärlkramp ska du kontakta akutsjukvården.

Om andra biverkningar uppkommer som du tycker är besvärliga bör du kontakta din förskrivande läkare.

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.