

Zopiklon (Imovane, Zopiclon, Zopiclone, Zopiklon)

Vad är zopiklon?

Zopiklon används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär.

Zopiklon förstärker ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystem som ger sömngivande effekt.

Hur tar jag zopiklon?

Ta tabletterna tillsammans med vätska i samband med sänggående i sittande ställning. Zopiklon har en snabb sömngivande effekt (inom cirka 30 minuter). Det finns en risk för att bli beroende av zopiklon.

Det är därför viktigt att följa de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Behandlingen bör vara tillfällig och helst inte överstiga fyra veckor. Effekten av zopiklon kan minska efter upprepad användning.

Läkaren bedömer hur länge du behöver använda zopiklon. Om sömnbesvären kvarstår får du kontakta läkare och mer noggrant gå igenom varför besvären uppstår.

Utsättningsbesvär kan förekomma om behandlingen avslutas tvärt. Vid behandling i mer än ett par veckor bör dosen minskas i samråd med din läkare.

Om du tar zopiklon tillsammans med alkohol kan de förstärka varandras effekt vilket kan leda till exempelvis förvirring eller minnesförlust. Kombinera därför inte medicinen med alkohol utan att rådgöra med din läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Vissa läkemedel bör inte kombineras. Tala därför om för din läkare vilka andra läkemedel du använder, även receptfria

läkemedel eller naturläkemedel. Du ska inte använda zopiklon tillsammans med medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

Läkemedlet har i första hand positiva effekter men ibland kan de ge biverkningar. Vissa personer kan till exempel bli dåsiga eller få bitter/metallisk smak i munnen, men det försvinner ofta efter en tids behandling. Det är du själv som kan bedöma om du är tillräckligt alert för bilkörning.

Muntorrhet är vanligt, vilket ökar risken för hål i tänderna. Detta kan förebyggas med fluortillskott eller receptfria salivstimulerande medel.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.