

Tipspromenad – handhygienens dag 5/5

Dokumentet innehåller 8 frågor, tipstalonger och de rätta svaren.

Frågorna är inskrivna på enskilda ark, färdiga att skrivas ut. Ordna gärna en skiljefråga och ett pris!

Har ni frågor, hör gärna av er till oss på Vårdhygien!
010-24 22307

smittskydd.vardhygien@rjl.se

Lycka till!

Fråga 1

Förutom vid risk för stick och skärskador, när ska skyddshandskar användas:

1.

Vid alla vård- och omsorgsmoment om patienten är bärare av en multiresistent bakterie.

X.

Vid vård- och omsorgsmoment där händerna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor.

2.

Vid blodtrycksmätning på patient med känd blodsmitta.

Fråga 2

Varför ska händerna spritas före
handskanvändning?

1.

Så att utsidan på handskarna bevarar sin renhetsgrad liksom handskarna som blir kvar i handskkartongen.

X.

Ifall handskarna skulle gå sönder under arbetet.

2.

För att hygienobservatören på jobbet talar på mig om detta.

Fråga 3

Varför kan jag inte sprita
handskarna?

1.

Handsprit är till för desinfektion av hud.
Handskar är inte gjorda av hud.

X.

Det ser illa ut framför patienten.

2.

Det är svårare att komma åt överallt.

Fråga 4

Vilket av nedanstående påståenden om vårdrelaterade infektioner är felaktigt:

1.

7-9 % av alla patienter som vårdas på sjukhus i Sverige har en vårdrelaterad infektion.

X.

Det saknas vetenskapliga bevis för att god handhygien minskar risken för vårdrelaterade infektioner.

2.

En vårdrelaterad infektion hos en patient som vårdas på sjukhus förlänger vårdtiden med i snitt 10 dygn.

Fråga 5

I vilken av nedanstående situationer ska handskar användas?

1. Vid bäddning.
X. Vid punktdesinfektion vid spill av urin.
2. Vid tillredning av smörgåsar.

Fråga 6

Vilken är den vanligaste smittvägen inom vård- och omsorgsverksamhet?

1.	Blodsmitta
X.	Luftburen smitta
2.	Kontaktsmitta via händer och föremål

Fråga 7

När ska vårdpersonal tvätta händerna med tvål och vatten?

1.

Det behövs inte. Tvål och vatten är till för patienter och besökare.

X.

Vid plötsligt söl av kroppsvätskor och handskar inte använts.

2.

Vid synlig nedsmutsning av händerna och när patienter kräks eller får diarré – det kan vara en tarmsmitta som inte avdödas av handsprit.

Fråga 8

Vilka riskfaktorer hos patienten ökar risken att sprida ESBL?

1. Bristande förmåga att tvätta sina händer.
X. Fjällande hudsjukdom.
2. Hosta och nysningar.

1 X 2

1		X	
2	1		
3	1		
4		X	
5		X	
6			2
7			2
8	1		

Skiljefråga:

Svarsblad

1 X 2

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Skiljefråga:

Ditt namn:

Tipspromenad

	1	X	2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Skilje fråga:.....

Namn:.....

Tipspromenad

	1	X	2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Skilje fråga:.....

Namn:.....

Tipspromenad

	1	X	2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Skilje fråga:.....

Namn:.....