

Premedicinering, generell ordination, operations- och intensivvårdskliniken Höglandssjukhuset Eksjö

Vilka av patientens ordinarie läkemedel som ska ges/tas inför operation ska ordineras i Cosmic av ansvarig läkare (operatör). Gäller både inneliggande och polikliniska patienter.

Premedicinering till patienter som ska opereras ska ges enligt följande rutin

Tablett Paracetamol 500 mg, 2 styck, per os

Kontraindikation mot paracetamol:

- Leversvikt.
- Överkänslighet mot paracetamol eller någon av beståndsdelarna.

Tablett Ibuprofen 400 mg per os

Kontraindikation mot NSAID:

- Överkänslighet mot det aktiva ämnet eller något hjälpämne.
- Tidigare GI-blödning i samband med NSAID-behandling.
- Återkommande gastrointestinalt sår/blödning.
- Ökad blödningsbenägenhet eller vid behandling av antikoagulantia.
- Astma, urtikaria eller akut rinit orsakad av ASA eller NSAID.
- Allvarlig hjärtsvikt, njursvikt eller leversvikt.
- Graviditet.
- Behov av EDA de kommande 24 timmarna.

Om enskild operatör motsätter sig NSAID före sina ingrepp ska detta tydligt vara dokumenterat på operationsanmälan.

Anestesi genomförs med multimodalt fokus. Det vill säga en kombination av blockader och läkemedel av olika slag. Vid förväntad svår postoperativ smärta (var god se rubrik nedan) är detta extra viktigt.

Förväntad svår postoperativ smärta

- Ljumsckbräck.
- Laparoskopisk tarmkirurgi/galoperation.

- Atrodes.
- Radiusfraktur.
- Hallux valgus.
- Fasciotomi.
- Axeloperation.
- Korsbandsplastik.
- Klavikelfraktur.
- Laparoskopisk ooforektomi.
- Anala operationer.

Vid påtaglig oro hos patienten kan lugnande läkemedel ordineras av anestesilog.

För att förebygga illamående vid laparoskopiska ingrepp och/eller anamnes av åksjuka ges:

Tablett Postafen 25mg, 1 st, per os

Vid osäkerhet/frågor kontaktas anestesilog.

Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia

