

Tikagrelor (Brilique, Tikagrelor)

Vad är Tikagrelor?

Tikagrelor är ett läkemedel som används om man får en blodpropp i hjärtat, det vill säga hjärtinfarkt. Medicinen används också förebyggande om man har kärlkrampsbesvär eller andra sjukdomar som ökar risken för att blodproppar ska bildas.

Tikagrelor används även för att förhindra blodproppar i hjärnan.

Det verksamma ämnet i medicinen, ticagrelor, förhindrar att blodplättarna klumpar ihop sig och bildar blodproppar.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tablettens med lite vatten. Det är viktigt att följa de anvisningar om dosering som du fått av din förskrivare. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen. Medicinen används oftast under en begränsad tid, från några dagar upp till tre år.

Viktigt

Om du glömt att ta en dos ska du bara ta nästa dos som vanligt. Ta inte två doser samtidigt för att kompensera för glömd dos.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling. En behandling ska alltid avslutas i samråd med förskrivare.

Det är viktigt att tala med sin läkare eller tandläkare minst en vecka innan en planerad operation eller tandbehandling när man tar Tikagrelor. Man kan behöva göra uppehåll i

sin medicinering i upp till 7 dagar före ingreppet på grund av den ökade blödningsrisken.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det mycket viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du använder. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. De allra flesta får inga biverkningar men en del som använder medicinen kan uppleva ökad andfåddhet. Den blodförtunnande effekten av läkemedlet kan också medföra att man blöder längre om man skär sig och att man får blåmärken lättare.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.