

Oktreotid (Octreotide, Oktreotid, Sandostatin, Sandostatin LAR)

Vad är oktreotid?

Oktreotid är läkemedel som används för att behandla symtom som orsakas av hormonproducerande tumörer i mag-tarmkanalen, så kallade neuroendokrina tumörer (NET).

Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet oktreotid. Det verkar genom att minska utsöndringen av hormoner och på så vis minskar symtom som diarréer, astmaliknande besvär och plötslig hudrodnad i ansiktet, så kallad flush. Skillnaden mellan medicinerna är att Sandostatin LAR och Octreotide verkar under längre tid än Sandostatin och Oktreotid.

Hur tar man medicinen?

Läkemedlet ges av sjukvårdspersonal. Oktreotid och Sandostatin ges 1-3 gånger dagligen som injektion eller infusion. Octreotide och Sandostatin LAR ges som injektion, vanligtvis var 4:e vecka. Din läkare bestämmer vilket alternativ som är bäst för dig.

Vad är rätt dos för mig?

Vi reagerar olika på mediciner. Din läkare kommer att anpassa dosen individuellt för dig baserat på behandlingsorsak, din ålder och ditt allmänna hälsotillstånd. Din dosering kan behöva justeras under behandlingstiden. För vissa personer räcker en lägre dos för att ha nytta av läkemedlet. Rådgör med din läkare om du är tveksam till fortsatt medicinering.

Provtagning

Om du ska vaccinera dig (t.ex. mot influensan), be din kontaktsjuksköterska om råd.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas samtidigt. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner inklusive receptfria mediciner eller naturläkemedel du använder.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. Av läkemedlet kan du bland annat uppleva huvudvärk, diarré, magsmärter, gasbildning i magen eller tarmarna, illamående och förstoppning. I samband med injektionen får en del en allergisk reaktion i form av nässelutslag eller svullnad i händer, fötter, anklar, ansikte, läppar, mun och hals. Patienter med diabetes kan få både högt och lågt blodsocker i samband med oktreotid. Man bör kontrollera blodsockret extra och kontakta läkare eller kontaktsköterska vid avvikande värden.

Vid misstanke om omfattande och/eller oacceptabla biverkningar bör du kontakta din läkare/kontaktsjuksköterska.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.