

Gemcitabin

Vad är gemcitabin?

Gemcitabin tillhör gruppen läkemedel som kallas cytostatika. Det används för att behandla lungcancer men även för bukspottkörtel-, äggstocks- och urinblåsecancer, och ges ensamt eller i kombination med andra cytostatika. Gemcitabin verkar genom att hindra tillväxten av cancerceller.

Hur tar man medicinen?

Gemcitabin ges av sjukvårdspersonal med särskild kunskap att hantera cytostatika. Gemcitabin ges som infusion (dropp) direkt i blodet under 30 minuter.

Läkaren anpassar dosen efter din ålder, kroppsstorlek och allmänna medicinska tillstånd. Dosen beror också på vilken annan behandling du får. Vanligtvis är en cykel att få 2 behandlingar på 2 veckor, 3:e veckan är man behandlingsfri.

Provtagning

Provtagning under behandlingen sker enligt läkarens ordination. Du får besked av din kontaktsjuksköterska när provtagning ska ske.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner inklusive receptfria mediciner eller naturläkemedel du använder.

Biverkningar

Några vanliga biverkningar av gemcitabin är diarré, illamående och kräkningar och påverkan på blodets sammansättning. Även influensalänkande symptom och lättare andfåddhet kan uppkomma.

Håret på huvudet kan tunnas ut, men det är sällsynt att man tappar allt hår.

Du får läkemedel som förebygger illamående inför din behandling.

Vid misstanke om biverkningar bör du kontakta din kontaktsjuksköterska. Om du drabbas av knipsmärtor i buken, diarréer, svettningar eller ett ökat tårflöde inom 24 timmar efter infusionen skall du inte dröja med att kontakta sjukvården. Hjälps finns för att snabbt häva dessa akuta biverkningar.

Om du drabbas av diarré mer än 24 timmar efter att du fått infusionen ska du använda medicin som stoppar diarré, t ex tablett loperamid, enligt särskild instruktion. Om effekten av loperamid uteblir och du har fler än 3-4 extra avföringar per dygn (utöver det vanliga) eller om du har mycket tunnflytande och riklig avföring/diarré, skall du kontakta sjukvården.

Det är viktigt att du också rapporterar till din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har tecken på infektion, eftersom gemcitabin kan påverka ditt immunförsvar.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.