

Remifentanil (Ultiva) 50 mikrogram/mL, (från 5 mg-flaska), OP Region Jönköpings län

Komposition för sprutpump

Remifentanil 5 mg (pulver)	1 x 5 mg
Natriumklorid 9 mg/mL	100 mL

Beredning

1. Använd en blandningsadapter.
2. Blanda Remifentanil ampull 5 mg med Natriumklorid 9 mg/mL, 100 mL infusionspåse.
3. Blanda noga. Koncentrationen av Remifentanil blir 50 mikrogram/mL.
4. Dra ut 50 mL av blandningen i en 50 mL-spruta avsedd för sprutpump.

Dosering

Individuell dosering. Använd sprutpump för TCI.

Observera

μ-opioid agonist med snabbt tillslag och mycket kort effektduration. Administrering av remifentanil kan ge hypotension, bradykardi, muskelrigiditet och andningsdepression. Effekten av remifentanil upphör inom 10 minuter efter att infusionen avslutats. Därför skall post-op smärtlindring ges i samband med avslutad remifentanil-administration.

Nalaxon kan ges som specifik antidot för att häva allvarlig andningsdepression och muskelrigiditet.

Hållbarhet och förvaring

Förvaras i rumstemperatur.

Beredd lösning ska användas inom 24 timmar.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT