

Personnr,  
 (år, mån,  
 dag, nr)

Namn

Adress

Tel

Datum:

Sign:

**Har patienten MRB-screenats under de senaste 12 mån? Ny screening endast om nya riskfaktorer tillkommit. Oavsett ovanstående, ska patient med riskfaktor MRB-screenas tidigast 90 dagar före planerad operation.**

	Riskfaktor	Ja*	Nej	*Odlas från	Ja Datum/ sign	Nej Datum/ sign
<b>1. Inventera risk- faktorer.</b>	Infekterade, rodnade, irriterade eller svårläkta sår, abscesser, bölder, eksem? (Ej rena operationssår.)			Aktuell hudskada  Näsa, svalg, rektum		
	Infarter t.ex. KAD, stomi, peg, trachealkanyl?  (CVK o PVK endast om infektionstecken vid insticksställe)			Infarter (CVK/ PVK-instick om infekterat)  Näsa, svalg, rektum  Vid KAD: urin		
	Vård utomlands, ineliggande eller polikliniskt, senaste 6 månaderna?			Näsa, svalg, rektum		
	Nyanländ till Sverige inom senaste 24 månaderna			Vid diarré: feces (istället för rektum)		
	Pågående diarrésjukdom med debut under eller upp till 6 månader efter utlandsvistelse?			Vid UVI-symtom: urin		
<b>2. Rums- placering i väntan på odlings- svar.</b>	<b>Riskfaktor</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Rumsrekommendation:</b>	<b>Kommentar och signatur:</b>	
	Infekterade sår, eksem, abscesser eller infarter?			Enkelrum. Individuell riskbedömning.		
	Vård utomlands, ineliggande eller polikliniskt senaste 6 månaderna?			Alltid enkelrum		
	Nyanländ senaste 24 månaderna			Enkelrum endast om annan MRB-riskfaktor föreligger		
	Diarrésjukdom?			Alltid enkelrum		