

Sunitinib (Sutent)

Vad är Sutent?

Sutent är ett läkemedel som används vid behandling av metastaserad njurcellscancer, neuroendokrina tumörer i bukspottskörteln och cancer i matstrupe, magsäck och/eller tarm.

Det verksamma ämnet i medicinen, sunitinib, verkar genom att bromsa tillväxten av cancer, minska spridningen och blockerar att nya blodkärl bildas hos cancer.

Du har fått Sutent för: _____

Hur tar man medicinen?

Sutent tas vanligtvis i behandlingsperioder om 6 veckor. Först tas en tablett dagligen i fyra veckor, därefter är det uppehåll i två veckor. Du bör ta tablettarna tillsammans med vätska, var noga med att skölja ner dem ordentligt. Du får inte dricka eller äta grapefruktjuice eller grapefrukt under behandlingstiden.

Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle de dagar behandlingen är ordinerad. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen. Tablettarna ska inte tuggas eller krossas.

Vad är rätt dos för mig?

Vi reagerar olika på mediciner. Din dosering kan behöva justeras under behandlingstiden. För vissa personer räcker en lägre dos för att ha nytta av läkemedlet. Det är viktigt att du inte på egen hand avbryter behandlingen. Rådgör med din läkare om du är tveksam till fortsatt medicinering.

Glömda doser

Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte

kommer på det förrän det är dags för nästa dos, kontakta din mottagning.

Provtagning

Provtagning under behandlingen sker enligt läkarens ordination. Du får besked av din kontaktsjuksköterska när provtagning ska ske.

Om du ska vaccinera dig (t.ex. mot influensan), be din kontaktsjuksköterska om råd.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas samtidigt. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner inklusive receptfria mediciner eller naturläkemedel du använder.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. Av Sutent kan du bland annat uppleva trötthet, illamående, diarré, förändringar i munslemhinnan, få högt blodtryck och hudförändringar framförallt på fötter och händer. Vid misstanke om omfattande och/eller oacceptabla biverkningar bör du kontakta din läkare/kontaktsjuksköterska. Det är viktigt att du rapporterar till din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har tecken på infektion, eftersom Sutent kan påverka ditt immunförsvar.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.