

Ciprofloxacin

Vad är Ciprofloxacin?

Ciprofloxacin är ett bakteriedödande läkemedel som tillhör antibiotikagruppen kinoloner. Kinoloner är så kallade bredspektrumantibiotika. Det betyder att de verkar på många olika sorters bakterier. Ciprofloxacin används bland annat för att behandla urinvägsinfektioner och infektioner i mage och tarm. Medicinen används också vid infektioner i hud, skelett och leder.

Hur tar man medicinen?

Du bör ta tablettorna tillsammans med vätska, var noga med att skölja ner dem ordentligt. Tabletterna bör sväljas hela och inte tuggas eller krossas, eftersom tablettens hölje döljer att den smakar illa.

Det är viktigt att följa de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen.

Viktigt

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka. Om du upptäcker att du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra.

Kalcium, som finns i mjölkprodukter, kan göra att medicinen tas upp sämre i kroppen.

Man ska därför inte ta medicinen tillsammans med mjölk.

Kan jag dricka alkohol när jag använder Ciprofloxacin?

Alkohol påverkar inte effekten av Ciprofloxacin.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det mycket viktigt att du talar om vilka andra mediciner du tar. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar.

När man tar Ciprofloxacin kan man få diarré. Den går oftast över ett par dagar efter avslutad kur, filmjölk och yoghurt kan lindra besvären. Det finns en risk för att man får kraftiga hudreaktioner om man utsätts för starkt solljus eller solarielampor när man tar Ciprofloxacin. När man behandlas med antibiotika påverkas den normala bakteriefloran bland annat i underlivet. Det kan ibland orsaka en svampinfektion hos kvinnor.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.