

Adrenalin, INTERMITTENT inhalation, OP/IVA, Region Jönköpings län

Gäller vid inhalation med mask eller via respirator.

Komposition för INTERMITTENT inhalation

Adrenalin 1 mg/mL	Ordinerad mängd
Natriumklorid 9 mg/mL	Späd till totalvolym 2 mL

Beredning

1. Dra upp ordinerad mängd Adrenalin 1 mg/mL i en 5 mL-spruta.
2. Dra upp den mängd Natriumklorid 9 mg/mL som behövs för att den slutliga volymen ska bli 2 mL (2 mL minus ordinerad volym Adrenalin) i en 5 mL-spruta (se tabell nedan).
3. Tillsätt Adrenalin till Natriumklorid 9 mg/mL. Blanda noga.
4. Den blandade lösningen ska **omedelbart** sättas till inhalationskoppen.

Dosering

Dosen kan upprepas 1 - 2 gånger vid behov.

Vikt (kg)	Adrenalin 1 mg/mL (mL)	Natriumklorid 9 mg/mL (mL)
5	0,25	1,75
10	0,5	1,5
15	0,75	1,25
20	1	1
25	1,25	0,75
30	1,5	0,5
40	2	-
>50	2,5	-

Observera

Försiktighet vid svår hjärtsjukdom och graviditet.

Vid kontinuerlig inhalation är dosen en annan. Se separat beredningskort.

Hållbarhet och förvaring

Ljuskänsligt. Används direkt efter spädning.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT.