

Flukloxacillin (Heracillin)

Vad är flukloxacillin?

Flukloxacillin är ett bakteriedödande läkemedel som tillhör antibiotikagruppen penicilliner.

Flukloxacillin används vid hud- och mjukdelsinfektioner samt infektioner i leder, skelett och lungor som kan orsakas av bakterierna stafylokocker eller streptokocker.

Hur tar man läkemedlet?

Tabletterna ska helst tas mellan måltiderna – minst 1 timme före eller 2 timmar efter. Ta tabletterna med ett helt glas vatten och undvik att lägga dig ner omedelbart efter tablettintaget, för att undvika obehag eller irritation eller smärta i matstrupen.

Om du har sväljsvårigheter till den grad att du inte kan svälja tabletterna kan dessa krossas och blandas i vatten, men det finns en dragering på tabletterna för att skona normalfloran i munhåla och svalg som då förloras. Vid krossning av tabletterna ska munnen sköljas efter intag.

Det är viktigt att följa de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen.

Viktigt

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Om du upptäcker att du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du tar. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Kan jag dricka alkohol när jag använder flukloxacillin?

Alkohol påverkar inte effekten av flukloxacillin.

Biverkningar

Läkemedel har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar.

De allra flesta får inga biverkningar men en del som använder flukloxacillin kan få biverkningar i magtarmkanalen såsom diarré och illamående.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.